

LUONNOMUS

LUONONTIEELLINEN KESKUSMUSEO
NATURHISTORISKA CENTRALMUSEET
FINNISH MUSEUM OF NATURAL HISTORY

SAHLBERGIA

VUOSIKERTA 21 (2015), SUPPLEMENT 1

Kovakuoriaisten maakuntaluettelo 2015



Provincial List of Finnish Coleoptera 2015



Kovakuoriaisten maakuntaluettelo 2015 [Provincial List of Finnish Coleoptera 2015]. — Sahlbergia 21 Supplement 1: 1–164.

Kirjoittajat [authors]

Pertti Rassi (pertti.rassi@pp.inet.fi) Seppo Karjalainen (seppo.karjalainen@metsa.fi),
Tom Clayhills (tom.clayhills@parnet.fi), Eero Helve (eero.helve@kolumbus.fi),
Esko Hyvärinen (Esko.O.Hyvarinen@ymparisto.fi), Erkki Laurinharju (laurinharju@gmail.com),
Samps Malmberg (samps.malmberg@hotmail.com), Ilpo Mannerkoski (ilpo.mannerkoski@ymparisto.fi), Petri Martikainen (petri.martikainen@uef.fi), Jaakko Mattila (jaakko.x.mattila@helsinki.fi), Jyrki Muona (jyrki.muona@helsinki.fi), Mikko Pentinsaari (mikko.pentinsaari@oulu.fi),
Ilpo Rutanen (ilpo.rutanen@pp.inet.fi), Juha Salokannel (juha.salokannel@gmail.com),
Juha Siitonen (juha.siitonen@luke.fi), Hans Silfverberg (hans.silfverberg@helsinki.fi).

SAHLBERGIA (ISSN 2342-7582)

Julkaisija: Luonnonieteellinen keskuskmuseo LUOMUS

Päätoimittaja: Jere Kahanpää

Taittaja: Heidi Viljanen

Email: sahlbergia-lehti@helsinki.fi



Kansikuva:

Ottaja: Jyrki Muona

Päivämäärä 17.6.2009

Paikka: Suomi, Uusimaa, Vantaa [Finland, Uusimaa, Vantaa]

Aihe: Halavasepikkäkoiraat (*Hylochares cruentatus*) taistelemassa parhaasta asemasta naaraan kuoriutumisaukon ympäristillä suuren halavan rungolla (*Salix pentandra*). [Males of *Hylochares cruentatus* fighting for best position around the exit hole of an emerging female on the trunk of an old Jolster (*Salix pentandra*)].



Kovakuoriaisten maakuntaluettelo 2015

Pertti Rassi, Seppo Karjalainen, Tom Clayhills, Eero Helve, Esko Hyvärinen, Erkki Laurinharju, Sampsu Malmberg, Ilpo Mannerkoski, Petri Martikainen, Jaakko Mattila, Jyrki Muona, Mikko Pentinsaari, Ilpo Rutanen, Juha Salokannel, Juha Siitonens & Hans Silfverberg

Rassi, P., Karjalainen, S., Clayhills, T., Helve, E., Hyvärinen, E., Laurinharju, E., Malmberg, S., Mannerkoski, I., Martikainen, P., Mattila, J., Muona, J., Pentinsaari, M., Rutanen, I., Salokannel, J., Siitonens, J. & Silfverberg, H. 2015: Kovakuoriaisten maakuntaluettelo 2015 [Provincial List of Finnish Coleoptera 2015]. — Sahlbergia 21 Supplement 1: 1–164..

Johdanto

Suomen kovakuoriaisten maakuntaluettelo ei ole päivitetty uusimman Pohjoismaisen luettelon ilmestymisen jälkeen (Lindroth, 1960). Lajistossamme on tapahtunut paljon muutoksia niin nimistön kuin esiintymienkin suhteeseen. Tämän vuoksi kovakuoriaistyöryhmä katsottiin tarpeelliseksi kokonaan uuden luettelon teko. Sen kokominen on ollut haasteellista. Tavoitteena on ollut saada aikaan luotettava ja uusinta tietämystä vastaava maakuntalistaus. Suuri määrä vanhojen kokoelmien näytteitä on tarkistettu ja kaikkien hyvin harvinaisten lajien löydöt on pyritty todentamaan. Kovakuoriaistyöryhmä on viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana keskittynyt arvioimaan kovakuoriaisten uhanalaisuutta ja osana tästä laatinut uuden frekvenssiperistelukittelun. Työryhmä on samalla koonnut digitaalisen havaintotietokannan ja julkaisut lajiston levinneisyyskartaston Internetissä (The Finnish Expert Group on Coleoptera, 2010). Merkittävien havaintojen tallentamiseksi on luotu kovakuoriaistyöryhmän yhteydessä toimiva tarkastustyöryhmä. Nämä projektit ovat tukeneet toisiaan ja tuottaneet paljon uutta tietoa Suomen lajiston levinneisyydestä ja nykytilasta.

Tässä maakuntaluettelossa esitetään perinteisten maakuntahavaintojen lisäksi myös lajien voimassa olevat uhanalaisuusluokat sekä uudet frekvenssiperistearvat. Maakuntahavainnot on esitetty erikseen kahdelta ajanjaksoalta, rajapyykkinä on käytetty vuoden 1960 alkua. Vaikka kummankin ajanjakson havaintotiedot kaipaavat edelleen täydennyskäsiä, antaa käytetty jaottelu hyvän mahdollisuuden tarkastella lajien levinneisyydessä tapahtuneita muutoksia, jotka ovat monessa tapauksessa erittäin selviä ja mielenkiintoisia.

Toivomme, että tämä maakuntaluettelo kuluu käyttäjien käissä ja innostaa harrastajia tekemään uusia maakuntalöytöjä. Jatkossa maakuntaluettelo pidetään yllä kova-

kuoriaistyöryhmän havaintotietokannan yhteydessä, joten uudet maakuntahavainnot tulee ilmoittaa joko suoraan kovakuoriaistyöryhmälle tai tallentaa Internetissä julkiseen hyönteistietokantaan. Olisi tärkeää, että uusiin maakuntalöytöihin liittyvät yksilöt tallennettaisiin joko omaan tai julkiseen kokoelmaan, jotta niiden määritys voidaan tarpeen vaatiessa tarkastaa myöhemmin.

Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat antaneet havaintojaan käyttöömme tai muuten auttaneet tämän luettelon valmistelussa. Kiitämme myös ympäristöministeriötä taloudellisesta tuesta.

Käytetty nimistö

Nimistö ja systematiikka noudattavat 2000-luvulla ilmestyneittä kahdeksanosista palearktisten kovakuoriaisten luetteloa, jonka Suomen oloihin on soveltanut Silfverberg (2010; 2013; 2014a; 2014b). Lajiluettelossa on huomioitu kaikki kovakuoriaisten tarkastustyöryhmän 6.5.2015 mennessä käsitlemät tapaukset (mm. Clayhills, 2014; Pentinsaari, 2014; Salokannel, 2015). Sukuryhmän Miarini osalta tarkastustyöryhmä päätyi seuraamaan palearktisen luettelon taksonomiaa (Caldara, 2013).

Uhanalaisuusluokat

Esitetyt uhanalaisuusluokat ovat vuoden 2010 IUCN kriteerein arviodun luokitukseen mukaiset (Hyvärinen ym., 2010). Luettelossa esitetään myös punaisen listan ulkopuolelle jäädelle lajeille uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä annetut luokat (LC, NE, NA), joita ei ole aiemmin julkaistu. Uhanalaisuusarvioinnin jälkeen Suomesta löytyneille lajeille on annettu luokaksi NA, mikäli niiden on arvioitu levinneen maahamme vuoden 2000 jälkeen. Uhan-

alaisuuksluokka jäettiin antamatta sellaisille Suomesta äskettäin löytyneille lajeille, joiden tiedetään tai arvellaan esiintyneen täällä vanhastaan. Niiden luokat tullaan määrittelemään seuraavan uhanalaisuuksarvioinnin yhteydessä.

10	201–400
6	401–800
4	801–1600
2	1601–3200
1	3201–

Uhanalaisuuksluokkien lyhenteet:

- RE** hävinneet
- CR** äärimmäisen uhanalaiset
- EN** erittäin uhanalaiset
- VU** vaarantuneet
- NT** silmälläpidettävät
- DD** puutteellisesti tunnetut
- LC** elinvoimaiset
- NE** arvioimatta jätetyt
- NA** arviointiin soveltuumattomat

Alle 30 frekvenssipisteen lajen pistet annettiin arvioimalla lajin todellinen levinneisyysalue kartalta tietokannan havaintopisteisiin perustuen. Pisteitä annettaessa pyrittiin ottamaan huomioon myös lajin elinympäristövaatimukset, eli kuinka monesta ruudusta lajin levinneisyysalueella löytyy lajille sopivaa elinympäristöä. Esimerkiksi tavallista talousmetsää löytyy lähes jokaisesta kymppiruudusta kun taas avoimia rantahietikkoja vain rajallisesta määrästä ruutuja. Saadakseen frekvenssipistearvon 1 lajin täytyy olla levinnyt lähes koko Suomeen.

Frekvenssipisteet

Frekvenssipisteissä on käytetty samaa arvointitapaa kuin edellisessä frekvenssipisteluetellossa (Rassi, 1993). Tarkastelujakso on 1.1.1980–1.1.2010. Tarkastelujakson jälkeen tehdyt havainnot on kuitenkin otettu huomioon harvinaisimpien ja äskettäin levinneiden tai runsastuneiden lajen pistetä annettaessa. Arvointityössä tärkein tietolähde on ollut kovakuoriaistyöryhmän kokoama havaintotietokanta, jossa on tällä hetkellä noin 700.000 kovakuoriaishavaintoa. Uhanalaisten lajen kohdalla on käytetty myös ympäristöhallinnon HERTTA Eliölajit -tietokannan tietoja. Kunkin lajin arvointia tehtäessä on otettu huomioon myös kaikki muut työryhmän tiedossa olleet havainnot.

Frekvenssipisteet pyrkivät kuvaamaan lajen yleisyyttä Suomessa ja ne perustuvat kunkin lajin tunnettujen tai arvioitujen esiintymispaiikkojen lukumäärään. Käytännössä tarkastelu tehtiin kaavamaisesti ”kymppiruutujen” eli 10 km x 10 km yhtenäiskoordinaattiruutujen perusteella, joita on Suomen maa-alueilla lähes 3900. Kaikki yhden kymppiruudun sisällä sijainneet havaintopisteet katsottiin yhdeksi esiintymispaiaksi ja toisaalta kaikki kymppiruudut laskettiin erillisiksi esiintymispaiiksi. Frekvenssipisteet määrätyivät esiintymispaiikkojen eli kymppiruutujen lukumäärän perusteella seuraavasti:

Frekvenssipisteet	Kymppiruutujen lukumäärät
100	0–3
80	4–6
60	7–12
40	13–25
30	26–50
20	51–100
15	101–200

Frekvenssipisteet 40–100 annettiin laskemalla tarkastelujaksolla kertyneiden todellisten esiintymispaiikkojen (kymppiruutujen) lukumäärät. Kaavamaisesti laskettua pistearvoa laskettiin harkinnan mukaan sellaisten lajen kohdalla, joille oli kertynyt tarkastelujakson aikana silmiinpistävä vähän havaintopisteitä suhteessa tunnettuun levinneisyyteen alhaisesta keräilyaktiivisuudesta johtuen. Frekvenssipistearvoa 30 annettaessa käytettiin molempia edellä kuvattuja menetelmiä.

Hävinneeksi ”tähtilajiksi” on katsottu ainoastaan lajit, joita ei ole löydetty Suomesta vuoden 1979 jälkeen. Tämä on merkitty frekvenssipistearvolla 100*. Tilapäislouonteiset tuontilajit (importit) on merkitty frekvenssipistesarakkeeseen i-kirjaimella ilman frekvenssipistearvoa. Ihmisen mukana kulkeutuneille, pysyviä lisääntyviä kantoja muodostaneille lajeille on annettu frekvenssipisteet normaaliiin tapaan.


Maakuntahavainnot

Maakuntahavainnot on jaoteltu kahteen ajanjaksoon: vuoden 1959 loppuun mennessä tehtyihin ja vuoden 1960 alusta tehtyihin havaintoihin. Käytettyjä suomenkielisiä maakuntalyhenteitä vastaavat maakunnat ja niiden latinisoidut lyhenteet kävät ilmi kuvasta 1. Pohjoisista maakunnista on käytetty kirjallisuudessa myös seuraavia lyhenteitä: OP = ObS, PeP = ObN, KiL = LkW ja SoL = LkE. Vuoden 1960 maakuntaluetellossa KiL ja SoL muodostivat yhdessä maakunnan KemL = Lkem.

Tärkeimmät havaintolähteet ovat olleet museo- ja yksityiskokoelmat sekä kovakuoriaistyöryhmän havaintotietokanta. Tietoja on saatu myös suoraan monilta hyön-

teisharrastajilta sekä julkisesta Hyönteistietokannasta (Luomus 2015). Museokokoelmista vain Luonnonlaitosmuseon kokoelmat on käytetty suhteellisen kattavasti läpi, eikä sielläkään ole tarkastettu kaikkia määritetyksiä. Muiden museoiden kokoelmat on käytetty läpi vain osittain. Museokokoelmista on siis löydettävissä vielä täydennysjärjestelmiä luetteloon. Kaikista havainnoista on kirjattu ylös tietolähde (yleensä kokoelma josta tieto on peräisin). Valtaosa maakuntahavainnoista perustuu kokoelmayksilöihin, mutta mukana on jonkin verran myös havaintotietoja, joihin liittyviä yksilöitä ei ole enää olemassa (mm. erilaiset tutkimusaineistot ja suoraan harrastajilta saadut tiedot). Mukaan on kelpuuttettu myös muutamien kirjojen (Lindroth, 1985 ja 1986; Holmen, 1987; Nilsson & Holmen, 1995) luotettavaksi arvioitujen maakuntataulukkojen tietoja vaikka niitä koskevia yksilöitä ei ole enää löydetty tietoja kouttaessa.

Kustakin maakunnasta tehdyt havainnot on merkitty kyseisen maakunnan sarakkeeseen maakuntalyhenteellä. Myös vakiintuneet tuontilajit (ns. importit) ovat saaneet maakuntamerkinnän normaaliminaan. Vakiintumattomat tuontilajit, joille ei myöskään ole annettu frekvenssipisteitä, on merkitty maakuntasarakkeisiin i-merkinnällä. Jos laji on katsottu jossakin maakunnassa importiksi, vaikka se olisi vakiintunut laji jossain muissa maakunnissa, on maakuntasarakkeessa käytetty merkintää "i" (esim. laji *Phymatodes testaceus* maakunnassa EH).



Kuva 1. Suomen luonnonlaitosmuseon maakunnat.
Fig. 1. The biogeographical provinces of Finland

Provincial list of Finnish Coleoptera 2015

Introduction

The Finnish records of the latest distributional list of Fennoscandian Coleoptera have not been updated for Finland since its publication (Lindroth, 1960). Numerous changes, both in distribution and taxonomy have taken place during the past 55 years. In order to accommodate for these, the Finnish Expert Group for Beetles decided to create an entirely new provincial catalogue. This project turned out to be slow and demanding. Our aim was to produce as reliable a list as possible.

The Expert Group's main effort during the past decade has been directed towards estimating how threatened the Finnish beetles are. In order to achieve this, the Expert Group has produced a frequency classification, created a database

of beetle observations and published distribution maps of all Finnish beetles (The Finnish Expert Group on Coleoptera, 2010).

In addition to the provincial records, the current Red List categories and the new frequency estimates are given for all the species. The provincial records made before and after January 1st 1960 are given separately. This division provides a possibility to observe changes in distributions.

We hope that this catalogue will inspire entomologists to record beetles from less well-studied provinces. All new provincial records should either be reported to the Finnish Expert Group for Beetles, or be listed in a public database. Whenever possible, the specimen on which the record is based should be preserved in a private or public collection.

We would like to thank all those who have made their records available or otherwise helped us during the preparation of this catalogue. We also thank the Ministry of the Environment for financial support.

Nomenclature used

The taxonomy and systematics follow the latest Palearctic beetle catalogue, with modifications made by Silfverberg (2010; 2013; 2014a; 2014b). All records and taxonomic changes assessed by the Control Group of the Finnish Expert Group for Beetles were included (e.g. Clayhills 2014, Pentinsaari 2014, Salokannel 2015). The cut-off date was May 6th, 2015. The taxonomy of the tribe Miarini follows Caldara (2013).

The red list categories

The presented IUCN red list categories are in accordance with the 2010 Red List of Finnish Species (Hyvärinen et al., 2010). In addition we provide the categories for the non-threatened species as well (LC, NE, NA). These have not been published previously. Species reported from Finland after the latest assessment of threatened species were classified as NA, if they are supposed to have entered Finland after 2000. Recently reported species were left unclassified, if they were known or believed to be native but previously overlooked. Such species will be classified in the next assessment of threatened species.

Abbreviations for red list categories:

RE	Regionally Extinct
CR	Critically Endangered
EN	Endangered
VU	Vulnerable
NT	Near Threatened
DD	Data Deficient
LC	Least Concern
NE	Not Evaluated
NA	Not Applicable

Frequency scores

The frequency estimation method was the same as in the previous frequency score list of Finnish beetles (Rassi, 1993). The study period was 1.1.1980–1.1.2010. Later observations were considered for the rarest species, and for those that have recently entered Finland, or become commoner. The most important source was the database col-

lected by the Finnish Expert Group for Beetles, including some 700.000 observations. For threatened species the HERTTA database, maintained by the Finnish Environment Institute, was also available.

The frequency scores aim to present how common the species are in Finland. They are based on the known or estimated amount of localities where each species occurs. In principle the estimates are based on the around 3900 10 x 10 km standard coordinate squares, which cover the land area of Finland. All observations within one and the same square are considered as one occurrence. The frequency scores are based on the number of such occurrences, i.e. 10 x 10 km squares as follows:

Frequency score	Number of squares
100	0–3
80	4–6
60	7–12
40	13–25
30	26–50
20	51–100
15	101–200
10	201–400
6	401–800
4	801–1600
2	1601–3200
1	3201–

For common species (less than 30 frequency score) the score was based on the assumed actual distribution on a map, as indicated by the database records. When giving the scores, the habitat demands of the species were considered as well. There is, for instance, ordinary managed forest in almost every Finnish square, while open sandy beaches can be found in only a very limited number of squares. For a species to receive the frequency score 1 it must occur over almost all of Finland.

The frequency scores from 40 up were assigned based on the actual number of occurrences (squares) during the study period. If there was reason to believe that the low number of finds could be due to low collecting effort, the frequency score could be adjusted down.

Both these methods were considered for species given the frequency score 30. Species not found in Finland after 1979 were classified as having disappeared. For them the frequency classification 100* was used. Occasional imports did not receive any frequency scores. Instead they were marked in the column with the letter “i”. If species originally imported have established breeding populations,

they received the usual frequency scores for the corresponding provinces.

Province records

Province data was divided into two periods: before the year 1960, and from 1.1.1960 onwards. All observations have been assembled anew. The biogeographical provinces and the abbreviations used are shown in Fig. 1. In addition, the following abbreviations have been used in entomological literature: OP = ObS, PeP = ObN, KiL = LkW and SoL = LkE. In the 1960 provincial list provinces KiL and SoL were not separated and formed together province KemL = Lkem.

Most data came from public and private collections and from the records database, upheld by the Expert Group for Beetles. Some information also came from amateur entomologists and from the public through the Finnish Insect Database (Luomus 2015). As for museum collections, only the Finnish Museum of Natural History was consulted extensively. Other museum collections were studied only partly. The source for every observation was recorded (generally the collection where the specimen is situated). As a rule every provincial record is based on a collection specimen, but some data refer to specimens no longer available (e.g. various research materials, and information given by amateur collectors). We did include information from literature (Lindroth, 1985 and 1986; Holmen, 1987; Nilsson & Holmen 1995), when considered reliable, even when the specimens in question could no longer be found.

Records from each province were entered into the appropriate column using the province abbreviation. Established originally imported species were treated as native ones. The frequency of occasional imports was not estimated and their presence is indicated with the letter “i”. If a species was considered as established in Finland, but an import in some province, it is so marked for that province (e.g. *Phymatodes testaceus* in the province EH).

Kirjallisuus/References

- Caldara, R. 2013. Subfamily Curculioninae. Teoksessa: Löbl, I. & Smetana, A. (toim.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 8. Curculionoidea II. Brill, Leiden. 700 s.
- Clayhills, T. 2014. Coleoptera species new to Finland (2) (Coleoptera). Koleopterologische Rundschau 84: 353–357.
- Holmen, M. 1987. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. I. Gyrinidae, Haliplidae, Hydrobiidae and Noteridae. Fauna Entomologica Scandinavica 20. Brill, Leiden. 168 s.
- Hyvärinen, E., Mannerkoski, I., Clayhills, T., Helve, E., Karjalainen, S., Lauriharju, E., Martikainen, P., Mattila, J., Muona, J., Pentinsaari, M., Rassi, P., Rutanen, I., Salokannel, J., Siitonen, J. & Silfverberg, H. 2010. Kovakuoriaiset. Teoksessa: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.). Suomen laijien uhanalaisuus – Puunainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. s. 545–582.
- Lindroth, C.H. (ed.) 1960. Catalogus Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. Entomologiska Sällskapet i Lund, 1–476.
- Lindroth, C.H. 1985. The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. 1. Fauna Entomologica Scandinavica 15(1). Brill, Leiden. 225 s.
- Lindroth, C.H. 1986. The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. 2. Fauna Entomologica Scandinavica 15(2). Brill, Leiden. 497 s.
- Luomus 2015. Hyönteistietokanta. <http://hyonteiset.luomus.fi/insects/main/EntDatabase.html>
- Nilsson, A.N. & Holmen, M. 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II. Dytiscidae. Fauna Entomologica Scandinavica 32. Brill, Leiden. 192 s.
- Pentinsaari, M. 2014. Kuusi Suomelle uutta kovakuoriaislajia. Sahlbergia 20: 19–21.
- Rassi, P. (toim.) 1993. Suomen kovakuoriaisten (Coleoptera) frekvenssipisteet 1.1.1960–1.1.1990. Maailman Luonnon Säätiön WWF Suomen Rahaston Raportteja 6. Helsinki.
- Salokannel, J. 2015. Kaksi Suomelle uutta kovakuoriaislajia Pärikkalasta. Diamina 2015: 2–3.
- Silfverberg, H. 2010. Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Sahlbergia 16: 1–144.
- Silfverberg, H. 2013. What ever happened to *Apion* (Coleoptera, Curculionoidea). Sahlbergia 19: 44–49.
- Silfverberg, H. 2014a. Renaming weevils (Coleoptera, Curculionoidea). Sahlbergia 20: 35–38.
- Silfverberg, H. 2014b. Changes and additions to Enumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Sahlbergia 20: 39–53.
- The Finnish Expert Group on Coleoptera 2010. Suomen kovakuoriaisatlas / Atlas över Finlands skalbaggar / Atlas of the Beetles of Finland. <http://koivu.luomus.fi/elaintiede/kovakuoriaiset/catlas1.htm>.

Kovakuoriaisten maakuntaluettelo 2015

luokka	F-pist.	jaksot	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
--------	---------	--------	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

Sphaeriusidae

Sphaerius

acaroides Waltl, 1838

DD	100*	<1960		V																			
		≥1960		V																			

Gyrinidae

Gyrinus

minutus Fabricius, 1798

LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	

opacus Sahlberg, 1819

LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
		≥1960	A	V	U	EK		EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

aeratus Stephens, 1835

LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
		≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	

pullatus Zaitzev, 1908

LC	10	<1960		V	U	EK		EH			PH	PS			Kn								
		≥1960	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP							

marinus Gyllenhal, 1808

LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL	

distinctus Aubé, 1838

NT	40	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP												
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH		EP													

suffriani Scriba, 1855

LC	60	<1960	A		U																		
		≥1960		V	U	EK		EH	ES		PS												

natator (Linnaeus, 1758)

LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP						
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	PeP						

substriatus Stephens, 1828

LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP						
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn							

paykulli Ochs, 1927

LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn							
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK						PK							

Orectochilus

villosus (Müller, 1776)

LC	20	<1960		V	U		St	EH	ES		PH												
		≥1960	V	U	EK		EH	ES	LK						PK								

Haliplidae

Brychius

elevatus (Panzer, 1793)

LC	15	<1960		V	U		St		ES		EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP		SoL		InL
		≥1960	V	U	EK		St	EH								OP		Ks	KiL		EnL	

Haliplus

flavicollis Sturm, 1834

LC	30	<1960	A	V	U	EK	St		ES														
		≥1960	A	V	U			St															

fulvus (Fabricius, 1801)

LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL	SoL	EnL	InL
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP						

variegatus Sturm, 1834

NT	60	<1960	A	V	U		St																
		≥1960	A																				

confinis Stephens, 1828

LC	15	<1960	A	V	U		St	EH		LK	EP			PK	KP	Kn	OP						
		≥1960	A	V	U	EK	St			EP				KP	Kn	OP		Ks					

varius Nicolai, 1822

VU	100*	<1960							EH	ES													
		≥1960							EK														

obliquus (Fabricius, 1787)

Trachypachidae

Trachypachus

zetterstedtii (Gyllenhal, 1827)	LC	40	<1960	U	St	EH	ES					Kn		Ks			
			≥1960						PH	PK			Ks	Kil	SoL	InL	

Noteridae

Noterus

<i>clavicornis</i> (DeGeer, 1774)	LC	20	<1960	A	V	U		St											
			≥1960	A	V	U	EK	St											
<i>crassicornis</i> (Müller, 1776)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP	

Dytiscidae

Liopterus

Laccophilus

hyalinus (DeGeer, 1774)

		≥ 1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	PS				
minutus (Linnaeus, 1758)	LC	20	<1960	A	V		EH	ES						

Volume 10 | Issue 1 | 2025

biguttatus Kirby, 1837

Laccornis *L. (Ptychosperma) glauco* 1960 A KIL

Stronger (-)

Bidessus

<i>Brachysomus</i>																			
unistriatus (Goeze, 1777)	LC	30	<1960	A	V	U										PK			

grossepunkt

Hydroglyphus																									
geminus (Fabricius, 1792)	LC	15	<1960	A	V	U			E	H	ES	LK				PS	PK								

hamulatus (Gy)

ovatus (Lin)

Hygrotus

Hygrocybe																				
decoratus (Gyllenhal, 1810)	LC	10	<1960	A	V	U		EH	ES	LK		PS	PK							

inaequalis

<i>versicolor</i> (Schaller, 1783)	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks					
<i>quinquelineatus</i> (Zett., 1828)	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Kil					
<i>polonicus</i> (Aubé, 1842)	NA	100	<1960	U EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL					
<i>impressopunctatus</i> (Schaller, 1783)	LC	6	<1960	St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL					
<i>parallelogrammus</i> (Ahrens, 1812)	NT	80	<1960	EK					
<i>novemlineatus</i> (Stephens, 1829)	LC	15	<1960	A V U EK St EH LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL					
<i>marklini</i> (Gyllenhal, 1813)	LC	30	<1960	V EH EP PH PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol InL					
<i>nigrolineatus</i> (Steven, 1808)	NA	100*	<1960	A U EK EH PeP Kil EnL InL					
<td data-cs="9" data-kind="parent">Hydroporus</td> <td data-kind="ghost"></td>	Hydroporus								
<i>nigrita</i> (Fabricius, 1792)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL					
<i>brevis</i> F.Sahlberg, 1834	LC	40	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL					
<i>acutangulus</i> Thomson, 1856	LC	30	<1960	V U EH EP PS Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL					
<i>discretus</i> Fairmaire, 1859	LC	40	<1960	A V U St EH OP					
<i>pubescens</i> (Gyllenhal, 1808)	NT	30	<1960	A V U EK St EP PH PS PK KP					
<i>fuscipennis</i> Schaum, 1868	LC	20	<1960	A V U EK St EH LK EP PH PS KP Kn OP Ks Kil EnL InL					
<i>planus</i> (Fabricius, 1782)	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PK KP					
<i>obscurus</i> Sturm, 1835	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL					
<i>elongatus</i> Sturm, 1835	NA	100*	<1960	A V U EK St EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL					
<i>semenowi</i> Jakowlew, 1897	DD	40	<1960	U					
<i>geniculatus</i> Thomson, 1854	LC	10	<1960	V St EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL					
<i>nigellus</i> Mannerheim, 1853	LC	30	<1960	A V U EH EP PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL					
<i>submuticus</i> Thomson, 1874	VU	60	<1960	A V U EK St PS PK Kn OP PeP Ks Kil Sol InL					
<i>notabilis</i> LeConte, 1850	LC	20	<1960	V LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL					
<i>erythrocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL					
<i>rufifrons</i> (Müller, 1776)	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL					
<i>scalesianus</i> Stephens, 1828	LC	20	<1960	A V U EK EH EP PS PK KP Kn OP PeP Kil EnL InL					
<i>angustatus</i> Sturm, 1835	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP					
<i>lapponum</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	30	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP					
<i>puberulus</i> LeConte, 1850	LC	30	<1960	Kil Sol EnL InL					
			>1960	St EH PH PS KP Kn OP					

<i>glabriusculus</i> Aubé, 1838	NT	30	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL				
			≥1960	A V U EK EH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL				
<i>umbrosus</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL	EnL	InL		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL				
<i>morio</i> Aubé, 1838	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL	EnL	InL		
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL				
<i>tristis</i> (Paykull, 1798)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL	EnL	InL		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL				
<i>gyllenhali</i> Schiødte, 1841	NT	80	<1960	A V U EK				
			≥1960	A V U				
<i>notatus</i> Sturm, 1835	NT	100	<1960	A		KiL	SoL	InL
			≥1960	A		Ks		InL
<i>incognitus</i> Sharp, 1869	LC	4	<1960	A V U EH EP PH PS PK KP	OP	PeP	Ks	
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL				
<i>striola</i> (Gyllenhal, 1826)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL	EnL	InL		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL				
<i>palustris</i> (Linnaeus, 1761)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL	EnL	InL		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL				
<i>neglectus</i> Schaum, 1845	LC	15	<1960	V U EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP	KiL		InL	
			≥1960	A V U EK EH ES PH PS PK KP Kn OP	KiL		EnL	InL
<i>melanarius</i> Sturm, 1835	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP	Ks	KiL	SoL	EnL InL
<i>longicornis</i> Sharp, 1871	LC	20	<1960	V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP	Ks	KiL		InL
			≥1960	A U EH PS PK Kn PeP	Ks	KiL	EnL	InL
<i>memnonius</i> Nicolai, 1822	LC	15	<1960	A V U EH ES LK PH PS PK	PeP	KiL	EnL	InL
			≥1960	A V U EK St EH ES PH PK Kn PeP	Ks	KiL	EnL	InL
<i>sahlbergi</i> (Nilsson, 2001)	LC	40	<1960	PS Kn PeP	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960		KiL		EnL	InL
Porhydrus								
<i>lineatus</i> (Fabricius, 1775)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP				
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK Kn				
Graptodytes								
<i>granularis</i> (Linnaeus, 1767)	LC	20	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP	Ks	KiL		
			≥1960	A V U St EH LK PH PK KP PeP			Sol	
<i>bilineatus</i> (Sturm, 1835)	VU	100*	<1960	A				
			≥1960	A				
<i>pictus</i> (Fabricius, 1787)	LC	30	<1960	EK EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP	KiL			
			≥1960	A U EK EH ES PH PS PK Kn				
Oreodytes								
<i>alpinus</i> (Paykull, 1798)	LC	20	<1960	EP PS PK Kn OP PeP	Ks	KiL	SoL	EnL InL
			≥1960	PK Kn OP PeP	Ks		EnL	InL
<i>septentrionalis</i> (Gyllenhal, 1826)	LC	30	<1960	PK Kn OP PeP	Ks	KiL	SoL	EnL InL
			≥1960	OP Ks KiL SoL				
<i>sanmarkii</i> (Sahlberg, 1826)	LC	30	<1960	PK Kn OP PeP	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	OP PeP Ks KiL SoL				
Suphydrus								
<i>dorsalis</i> (Fabricius, 1787)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP	KiL	SoL		InL
			≥1960	A V U EK St EH ES PH PS PK Kn OP	Ks		EnL	InL
<i>figuratus</i> (Gyllenhal, 1826)		60	<1960			KiL	EnL	InL
			≥1960					
Deronectes								
<i>latus</i> (Stephens, 1829)	VU	80	<1960		Kn OP	Ks		
			≥1960			Ks		
Scarodytes								
<i>halensis</i> (Fabricius, 1787)	LC	15	<1960	A V U St ES LK				InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn				

Nebrioporus

<i>assimilis</i> (Paykull, 1798)	LC	30	<1960	U St EH ES EP PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	EP KP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>depressus</i> (Fabricius, 1775)	LC	6	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL EnL

Stictotarsus

<i>griseostriatus</i> (DeGeer, 1774)	LC	15	<1960	A V U St EP KP OP PeP
			≥1960	A V U EK St KP
<i>multilineatus</i> (Falkenström, 1922)	LC	20	<1960	Kn KiL EnL InL
			≥1960	Ks KiL SoL EnL InL

Platambus

<i>maculatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Agabus

<i>unguicularis</i> (Thomson, 1867)	LC	20	<1960	A V U St EH EP PS PK Kn
			≥1960	A V EK St EH EP PH PS PK KP OP
<i>affinis</i> (Paykull, 1798)	LC	1	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
<i>biguttulus</i> (Thomson, 1867)	LC	15	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL
			≥1960	V U EK St EH EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL InL
<i>paludosus</i> (Fabricius, 1801)	NT	60	<1960	A V U EK EH ES PH PS PK
			≥1960	A V U EK St EH PH PK
<i>adpressus</i> Aubé, 1837	LC	40	<1960	
			≥1960	KiL SoL EnL InL
<i>guttatus</i> (Paykull, 1798)	LC	4	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH EP PS PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL
<i>melanarius</i> Aubé, 1837	LC	15	<1960	V U St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP
			≥1960	V U St EH PH PS PK Kn PeP KiL InL
<i>bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>striolatus</i> (Gyllenhal, 1808)	NT	60	<1960	A V U St EH EP PK
			≥1960	V U EH EP
<i>sturmii</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL
<i>arcticus</i> (Paykull, 1798)	LC	6	<1960	
			≥1960	U EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>zetterstedti</i> Thomson, 1856	LC	20	<1960	
			≥1960	Kn OP PeP KiL SoL EnL InL
<i>elongatus</i> (Gyllenhal, 1826)	LC	20	<1960	V U EH EP PH PS PK Kn OP PeP KiL SoL EnL InL
			≥1960	St EH PH PK Kn OP Ks SoL InL
<i>moestus</i> (Curtis, 1835)	VU	100*	<1960	
			≥1960	
<i>congener</i> (Thunberg, 1794)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL
<i>lapponicus</i> (Thomson, 1867)	LC	10	<1960	
			≥1960	PH Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>thomsoni</i> (J.Sahlberg, 1871)	LC	15	<1960	
			≥1960	KiL EnL InL
<i>pseudoclypealis</i> Scholtz, 1933	VU	100*	<1960	
			≥1960	
<i>discolor</i> (Harris, 1828)	NT	80	<1960	
			≥1960	KiL EnL InL
<i>clypealis</i> (Thomson, 1867)	VU	100	<1960	ES Kn
			≥1960	EH PK
<i>setulosus</i> (J.Sahlberg, 1895)	NT	60	<1960	ES PeP InL
			≥1960	Ks EnL InL

<i>confinis</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	40	<1960		EH		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL						
			≥1960													KiL	SoL	EnL	InL					
<i>infuscatus</i> Aubé, 1838	VU	100	<1960																InL					
			≥1960																					
<i>fuscipennis</i> (Paykull, 1798)	LC	6	<1960	V	U	EH		PH	PS		KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK	KP	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
<i>uliginosus</i> (Linnaeus, 1761)	EN	100	<1960	A	V	U	EK		EH			PK												
			≥1960	A																				
<i>labiatus</i> (Brahm, 1790)	LC	40	<1960	A	V	U								PeP		KiL		EnL	InL					
			≥1960	A										Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
<i>serricornis</i> (Paykull, 1799)	LC	2	<1960	A	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL		EnL	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
Ilybius																								
<i>wasastjernai</i> (Sahlberg, 1824)	LC	20	<1960		V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL		
			≥1960		V	U		St	EH					PK		Kn	OP		Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>opacus</i> (Aubé, 1837)	LC	15	<1960					EH			EP	PH	PS	PK		Kn		PeP	Ks			EnL	InL	
			≥1960			U		St	EH	ES	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL	
<i>chalconatus</i> (Panzer, 1796)	LC	30	<1960	A	V						PS								KiL					
			≥1960	A	V																			
<i>subtilis</i> (Erichson, 1837)	LC	15	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP		KiL				
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH		PK	KP		OP							
<i>erichsoni</i> (Gemm. & Harold, 1868)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>vittiger</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	30	<1960					EH			PH	PS	PK			Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960											PK		Kn	OP			KiL	SoL	EnL	InL	
<i>picipes</i> (Kirby, 1837)	LC	15	<1960																					
			≥1960			U																		
<i>angustior</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>crassus</i> Thomson, 1856	LC	2	<1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>subaeneus</i> Erichson, 1837	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>ater</i> (DeGeer, 1774)	LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL			
<i>guttiger</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>quadriguttatus</i> (Lacordaire, 1835)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP								
<i>similis</i> Thomson, 1856	LC	15	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK									
			≥1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	PH	PS	PK		Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>aenescens</i> Thomson, 1870	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	SoL	EnL	InL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>fuliginosus</i> (Fabricius, 1792)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL		InL
<i>fenestratus</i> (Fabricius, 1781)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		KiL	SoL	EnL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	PeP	Ks		SoL		InL	
Rhantus																								
<i>grapii</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES		EP	PH	PS		KP	Kn								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH		EP	PH	PS	PK			OP							
<i>suturalis</i> (MacLeay, 1825)	LC	40	<1960	A	V	U			ES															
			≥1960	A	V	U	EK	St																
<i>frontalis</i> (Marsham, 1802)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP			PeP						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP		OP	PeP					
<i>notaticollis</i> (Aubé, 1837)	LC	15	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn	OP							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn							

<i>suturellus</i> (Harris, 1828)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL
<i>bistriatus</i> (Bergsträsser, 1778)	RE	100	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>exoletus</i> (Forster, 1771)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL
<i>fennicus</i> Hulden, 1982	VU	100	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	Kn InL
Colymbetes				
<i>fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	RE	100*	<1960	A V U EH PS
			≥1960	
<i>paykulli</i> Erichson, 1837	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>striatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP SoL
<i>dolabratus</i> (Paykull, 1798)	LC	20	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL InL
			≥1960	KiL SoL EnL InL
Hydaticus				
<i>transversalis</i> (Pontoppidan, 1763)	VU	100	<1960	A
			≥1960	A
<i>aruspex</i> Clark, 1864	LC	15	<1960	V U St EH LK PS
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP
<i>seminiger</i> (DeGeer, 1774)	LC	15	<1960	A U St EH ES
			≥1960	A V U EK St EH LK PH
Graphoderus				
<i>austriacus</i> (Sturm, 1834)	NA	100a	<1960	
			≥1960	A
<i>bilineatus</i> (DeGeer, 1774)	LC	20	<1960	A V U EK EH PS PK Kn
			≥1960	A V U EK St EH PH PS PK
<i>cinereus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	40	<1960	A U
			≥1960	A V U EK EH ES LK
<i>zonatus</i> (Hoppe, 1795)	LC	15	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK Kn PeP KiL SoL EnL InL
Acilius				
<i>sulcatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK KP Kn PeP Ks KiL SoL
<i>canaliculatus</i> (Nicolai, 1822)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP InL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL InL
Dytiscus				
<i>dimidiatus</i> Bergsträsser, 1778	NA	100	<1960	
			≥1960	V U
<i>marginalis</i> Linnaeus, 1758	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP
<i>latissimus</i> Linnaeus, 1758	LC	10	<1960	V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP
			≥1960	V U EK St EH ES LK PH PS PK Kn Ks SoL
<i>circumcinctus</i> Ahrens, 1811	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP KiL SoL EnL InL
<i>lapponicus</i> Gyllenhal, 1808	LC	10	<1960	V U St EH ES EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK KP OP Ks KiL EnL InL
Cybister				
<i>lateralimarginalis</i> (DeGeer, 1774)	NA	100	<1960	
			≥1960	V U EK
Carabidae				
Pelophila				
<i>borealis</i> (Paykull, 1790)	LC	20	<1960	
			≥1960	EH ES PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
				KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Leistus

<i>glabratus</i> Paykull, 1790	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>problematicus</i> Herbst, 1786	NT	100	<1960	
			≥1960	
<i>nitens</i> Linnaeus, 1758	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL
<i>convexus</i> Fabricius, 1775	VU	60	<1960	A V U
			≥1960	V U
<i>violaceus</i> Linnaeus, 1758	LC	6	<1960	A V U St EH ES PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL
			≥1960	A V U EK St EH PH PK Kn OP PeP Ks KiL
Cychrus				
<i>caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A V U St EH LK PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL
Blethisa				
<i>multipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES PS PK OP PeP KiL SoL EnL InL
Diacheila				
<i>arctica</i> (Gyllenhal, 1810)	LC	60	<1960	
			≥1960	KiL SoL EnL InL
Elaphrus				
<i>lapponicus</i> Gyllenhal, 1810	LC	40	<1960	
			≥1960	PS Kn PeP Ks KiL SoL InL
<i>uliginosus</i> Fabricius, 1792	VU	40	<1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL
			≥1960	A U PH OP Ks KiL SoL EnL
<i>cupreus</i> Duftschmid, 1812	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>riparius</i> (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Brachinus				
<i>crepitans</i> (Linnaeus, 1758)	NA	100a	<1960	
			≥1960	U
Clivina				
<i>fossor</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Dyschirius				
<i>thoracicus</i> (Rossi, 1790)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL InL
			≥1960	A V U EK St ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks EnL InL
<i>obscurus</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	30	<1960	V U ES PK KP Kn OP InL
			≥1960	U EK PK KP OP Ks InL
<i>angustatus</i> (Ahrens, 1830)	VU	80	<1960	
			≥1960	Ks InL
<i>nitidus</i> (Dejean, 1825)	RE	100*	<1960	U
			≥1960	
<i>politus</i> (Dejean, 1825)	LC	15	<1960	A V U St EH ES LK PS PK KP OP Ks SoL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH KP Kn OP Ks KiL SoL EnL
<i>impunctipennis</i> Dawson, 1854	VU	100	<1960	A St KP OP
			≥1960	St
<i>salinus</i> Schaum, 1843	EN	100	<1960	A V U
			≥1960	A U
<i>aeneus</i> (Dejean, 1825)	LC	40	<1960	A V EH LK
			≥1960	A U EK LK PK
<i>tristis</i> Stephens, 1827	LC	10	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK OP Ks
			≥1960	A V U EK St EH EP PH KP Kn OP Sol
<i>nigricornis</i> Motschulsky, 1844	LC	6	<1960	U EK ES EP PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>melancholicus</i> Putzeys, 1866	LC	40	<1960	
			≥1960	KiL EnL InL

<i>globosus</i> (Herbst, 1784)	LC	1 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>Broscus</i>	LC	15 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>cephalotes</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6 <1960 A V U EK EH ES LK EP PH KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>Miscodera</i>	LC	6 <1960 A V U EK EH ES LK EP PH KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>arctica</i> (Paykull, 1798)	LC	6 <1960 A V U EK EH ES LK EP PH KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>Patrobus</i>	LC	6 <1960 A V U EK EH ES LK EP PH KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>septentrionis</i> Dejean, 1828	LC	6 <1960 A V U EK EH ES LK EP PH KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>australis</i> J.Sahlberg, 1875	LC	60 <1960 A V U EK EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>assimilis</i> Chaudoir, 1844	LC	2 <1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>atrorufus</i> (Strøm, 1768)	LC	6 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>Trechus</i>	LC	2 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>secalis</i> (Paykull, 1790)	LC	2 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>rivularis</i> (Gyllenhal, 1810)	LC	15 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>rubens</i> (Fabricius, 1792)	LC	2 <1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>quadristriatus</i> (Schrank, 1781)	LC	10 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>Trechoblemus</i>	LC	30 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>micros</i> (Herbst, 1784)	LC	10 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>Blemus</i>	LC	10 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>discus</i> (Fabricius, 1792)	LC	10 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>Asaphidion</i>	LC	10 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>pallipes</i> (Dufschmid, 1812)	LC	15 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>flavipes</i> (Linnaeus, 1761)	LC	15 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>Bembidion</i>	NA	100a <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>striatum</i> (Fabricius, 1792)	LC	15 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>velox</i> (Linnaeus, 1761)	LC	100 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>lapponicum</i> Zetterstedt, 1828	CR	100 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>litorale</i> (Olivier, 1791)	LC	20 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>nigricorne</i> Gyllenhal, 1827	LC	20 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>pygmaeum</i> (Fabricius, 1792)	NA	100a <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>lampros</i> (Herbst, 1784)	LC	2 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>properans</i> (Stephens, 1828)	LC	10 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>obtusum</i> Audinet-Serville, 1821	NA	80 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

<i>oblongopunctatus</i> (Fabr., 1787)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Sol InL
<i>adstrictus</i> Eschscholtz, 1823	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>adstrictus</i> Eschscholtz, 1823	LC	2	>1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>quadrifoveolatus</i> Letzner, 1852	NT	60	<1960	A U EK EH LK PK Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>niger</i> (Schaller, 1783)	LC	4	<1960	A V U EK EH ES PK Kn OP PeP
<i>melanarius</i> (Illiger, 1798)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Sol
<i>melanarius</i> (Illiger, 1798)	LC	4	>1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP
<i>nigrita</i> (Paykull, 1790)	LC	6	<1960	A V U EH ES EP PS PK Ks
<i>nigrita</i> (Paykull, 1790)	LC	6	>1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL Sol
<i>rhaeticus</i> Heer, 1837	LC	2	<1960	A U ES PK Ks
<i>rhaeticus</i> Heer, 1837	LC	2	>1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>gracilis</i> (Dejean, 1828)	VU	80	<1960	A V U St EH EP
<i>minor</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol
<i>minor</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	2	>1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol
<i>strenuus</i> (Panzer, 1797)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol
<i>diligens</i> (Sturm, 1824)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>diligens</i> (Sturm, 1824)	LC	1	>1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
Calathus				
<i>fuscipes</i> (Goeze, 1777)	LC	30	<1960	A V U EK ES
<i>fuscipes</i> (Goeze, 1777)	LC	30	>1960	A V U ES
<i>erratus</i> (Sahlberg, 1827)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Sol
<i>erratus</i> (Sahlberg, 1827)	LC	4	>1960	A V U EK St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks Sol
<i>ambiguus</i> (Paykull, 1790)	NT	80	<1960	A V U ES KP
<i>ambiguus</i> (Paykull, 1790)	NT	80	>1960	A U EK
<i>melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	1	>1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>micropterus</i> (Duftschmid, 1812)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>micropterus</i> (Duftschmid, 1812)	LC	1	>1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
Sphodrus				
<i>leucophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	RE	100*	<1960	V U St EH PS Kn Ks
<i>leucophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	RE	100*	>1960	
Laemostenus				
<i>terricola</i> (Herbst, 1784)	CR	100	<1960	V U ES EP
<i>terricola</i> (Herbst, 1784)	CR	100	>1960	
Synuchus				
<i>vivalis</i> (Illiger, 1798)	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK Kn PeP
<i>vivalis</i> (Illiger, 1798)	LC	10	>1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol
Olisthopus				
<i>rotundatus</i> (Paykull, 1790)	NT	60	<1960	A V U EH ES
<i>rotundatus</i> (Paykull, 1790)	NT	60	>1960	A V U ES LK
Sericoda				
<i>bogemannii</i> (Gyllenhal, 1813)	VU	80	<1960	V EH KiL
<i>bogemannii</i> (Gyllenhal, 1813)	VU	80	>1960	ES PK Sol
<i>quadripunctata</i> (DeGeer, 1774)	LC	15	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol InL
<i>quadripunctata</i> (DeGeer, 1774)	LC	15	>1960	V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn OP Ks KiL Sol
Anchomenus				
<i>dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)	LC	30	<1960	V U St
<i>dorsalis</i> (Pontoppidan, 1763)	LC	30	>1960	A V U EK EH ES
Oxypselaphus				
<i>obscurus</i> (Herbst, 1784)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PS PK
<i>obscurus</i> (Herbst, 1784)	LC	6	>1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK

<i>glacialis</i> Villa & Villa, 1833	LC	30	<1960																	KiL	EnL	InL	
			≥1960																	KiL	SoL	EnL	InL
<i>granularis</i> (Linnaeus, 1761)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP		OP					
<i>discrepans</i> Rey, 1885	NA	100*	<1960																				
			≥1960																				
<i>minutus</i> Fabricius, 1775	LC	40	<1960	A	V	U		St	EH														
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH														
<i>lapponicus</i> Thomson, 1853	LC	20	<1960					U				PH	PS			Kn	OP	PeP		KiL	EnL	InL	
			≥1960					U	EK				PS					PeP		KiL	SoL	EnL	InL
<i>fulgidicollis</i> Motschulsky, 1860	NA	100*	<1960																				
			≥1960					A															
<i>griseus</i> Herbst, 1793	LC	80	<1960	A																			
			≥1960	A	U	EK		EH															
<i>nanus</i> Sturm, 1836	LC	40	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK					Kn	OP				InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH		LK			PK				PeP		KiL		InL	
<i>pumilio</i> Erichson, 1837	NA	100	<1960																				
			≥1960					EK															
<i>pallidus</i> Gebler, 1830	NT	60	<1960													Kn				KiL			
			≥1960					EK						PK						KiL		InL	
<i>laticollis</i> Thomson, 1853	NT	60	<1960	A	V	U	EK	St	EH		EP	PH	PS		KP	Kn	OP			KiL	SoL		
			≥1960	A	U	St	EH		LK											KiL			
<i>strigifrons</i> Thomson, 1868	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP		InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	SoL	InL		
<i>flavipes</i> Fabricius, 1792	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL	
<i>obscurus</i> Mulsant, 1844	NA	100	<1960																				
			≥1960	A																			

Georissidae

Georissus

crenulatus (Rossi, 1794)

LC	20	<1960	A	V	U		St	EH			PH										
		≥1960	A	V	U	EK	St							KP		OP					

Hydrochidae

Hydrochus

elongatus (Schaller, 1783)

NA	100	<1960																			
		≥1960																			

ignicollis Motschulsky, 1860

LC	10	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK							
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP						

crenatus (Fabricius, 1792)

NE	100*	<1960																			
		≥1960																			

brevis (Herbst, 1793)

LC	4	<1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK	EP		PS	PK			OP				
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP				

megaphallus van B. Heneg., 1988

LC	60	<1960																			
		≥1960	A	V	U																

Hydrophilidae

Berosus

spinifer (Steven, 1808)

LC	40	<1960	A	V	U		St														
		≥1960	A	V																	

fulvus Kuwert, 1888

	80	<1960	A																		
		≥1960	A	V																	

signaticollis (Charpentier, 1825)

NA	100	<1960																			
		≥1960	A																		

luridus (Linnaeus, 1761)

LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH			PH	PS									
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	KiL	SoL	InL

Coelostoma*orbiculare* (Fabricius, 1775)

LC	4 <1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP
	≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP

Cercyon*ustulatus* (Preyssler, 1790)

LC	10 <1960	A V U EK EH ES PH
	≥1960	V U EK St EH ES LK EP PS PK

laminatus Sharp, 1873

LC	20 <1960	ES
	≥1960	V U EK St EH EP PH PK KP OP

littoralis (Gyllenhal, 1808)

LC	20 <1960	A V U St
	≥1960	A V U EK St

depressus Stephens, 1829

NT	60 <1960	A V U
	≥1960	A V U

obsoletus (Gyllenhal, 1808)

CR	100 <1960	A V
	≥1960	A

castaneipennis Vorst, 2009

	15 <1960	
	≥1960	A V U EK EH ES LK EP

impressus (Sturm, 1807)

LC	2 <1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP
	≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks

haemorrhoidalis (Fabricius, 1775)

LC	2 <1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP OP KiL InL
	≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL InL

melanocephalus (Linnaeus, 1758)

LC	2 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
	≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL

emarginatus Baranowski, 1985

LC	40 <1960	
	≥1960	PK Kn Ks KiL

borealis Baranowski, 1985

LC	10 <1960	
	≥1960	PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL

lateralis (Marsham, 1802)

LC	2 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks EnL
	≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL

bifrenestratus Küster, 1851

LC	15 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP OP
	≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks Sol

marinus Thomson, 1853

LC	10 <1960	A V U St EH ES PK KP OP PeP
	≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP

unipunctatus (Linnaeus, 1758)

LC	4 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
	≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL Sol

quisquilius (Linnaeus, 1761)

LC	2 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL
	≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL

terminatus (Marsham, 1802)

LC	15 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL
	≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP

pygmaeus (Illiger, 1801)

LC	6 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP
	≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL

nigriceps (Marsham, 1802)

LC	20 <1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP OP
	≥1960	A V U St EH EP PH KP

tristis (Illiger, 1801)

LC	10 <1960	A V U St EH LK PS PK KP OP
	≥1960	A V U EK St EH ES PH KP Kn

convexusculus Stephens, 1829

LC	4 <1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP Ks SoL
	≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks

sternalis Sharp, 1918

LC	60 <1960	A
	≥1960	A V

analis (Paykull, 1798)

LC	1 <1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
	≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Megasternum*concinnum* (Marsham, 1802)

LC	2 <1960	A V U EH PH PS PK KP PeP KiL EnL
	≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL

Cryptopleurum*subtile* Sharp, 1884

LC	6 <1960	V U EH PH PS PK KP Kn OP
	≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP

<i>minutum</i> (Fabricius, 1775)	LC	1	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>crenatum</i> (Kugelann, 1794)	LC	20	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Sphaeridium				
<i>bipustulatum</i> Fabricius, 1781	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK
<i>marginatum</i> Fabricius, 1787	LC	15	<1960	A V U St EH ES EP
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PK
<i>lunatum</i> Fabricius, 1792	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PS PK OP PeP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PS PK OP PeP Ks
<i>scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks
Sphaeritidae				
Sphaerites				
<i>glabratus</i> (Fabricius, 1792)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
Histeridae				
Plegaderus				
<i>saucus</i> Erichson, 1834	LC	15	<1960	V U St EH ES EP PH PS PK PeP
			≥1960	V U EH ES PH PK KP Kn PeP
<i>vulneratus</i> (Panzer, 1797)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL InL
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL
<i>caesus</i> (Herbst, 1792)	NT	60	<1960	A V U
			≥1960	A V U
Acritus				
<i>minutus</i> (Herbst, 1792)	VU	80	<1960	V U St EH
			≥1960	U EK ES PS PK
<i>nigricornis</i> (Hoffmann, 1803)	LC	20	<1960	A V U St EH ES PH PS PK KP KiL
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PK Kn OP KiL
Teretrius				
<i>fabricii</i> Mazur, 1972	VU	100	<1960	
			≥1960	ES
Saprinus				
<i>rugifer</i> (Paykull, 1809)	VU	100	<1960	St
			≥1960	PS PK
<i>planiusculus</i> Motschulsky, 1849	VU	100*	<1960	
			≥1960	V U
<i>semistriatus</i> (Scriba, 1790)	LC	20	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PK OP
<i>immundus</i> (Gyllenhal, 1827)	VU	100*	<1960	U EH
			≥1960	EK
<i>aeneus</i> (Fabricius, 1775)	NT	30	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP KiL
			≥1960	A V U EK ES LK EP
Hypocaccus				
<i>rugiceps</i> (Duftschmid, 1805)	VU	80	<1960	St
			≥1960	KP OP Ks
<i>rugifrons</i> (Paykull, 1798)	LC	20	<1960	A U St ES EP PS KP
			≥1960	A V U EK St ES KP OP PeP
Gnathoncus				
<i>rotundatus</i> (Kugelann, 1792)	LC	30	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP OP
			≥1960	V U EK St EH ES PH Kn
<i>nannetensis</i> (Marseul, 1862)	LC	20	<1960	A V U EH ES PH PS PK KP PeP KiL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
<i>communis</i> (Marseul, 1862)	LC	30	<1960	A V U St EH PH PS
			≥1960	A V U EK EH ES EP PS Kn

<i>buyssoni</i> Auzat, 1917	LC	4	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP OP Ks Kil InL
<i>nidorum</i> Stockmann, 1957	VU	80	<1960	V U EH
			≥1960	V U ES PS
Myrmetes				
<i>paykulli</i> Kanaar, 1979	LC	4	<1960	A V U EK St EH PS KP InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks Kil InL
Dendrophilus				
<i>corticalis</i> (Paykull, 1798)	LC	30	<1960	V U LK
			≥1960	A V U St EH ES
<i>pygmaeus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A V U St EH ES KP OP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil
Carcinops				
<i>pumilio</i> (Erichson, 1834)	LC	10	<1960	V U St EH ES PH
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP
Paromalus				
<i>flavicornis</i> (Herbst, 1792)	VU	100	<1960	V
			≥1960	V
<i>parallelepipedus</i> (Herbst, 1792)	LC	30	<1960	A V U St EH PH
			≥1960	A V U EK EH ES LK PH PS PK
Marginotus				
<i>brunneus</i> (Fabricius, 1775)	NT	40	<1960	A V U EK St EH ES LK PK KP Kn Ks
			≥1960	V U EK St EH ES LK
<i>striola</i> (Sahlberg, 1819)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Kil
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
<i>merdarius</i> (Hoffmann, 1803)	LC	30	<1960	A V U EH ES PH
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PS
<i>terricola</i> (Germar, 1824)	NA	100	<1960	
			≥1960	ES
<i>obscurus</i> (Kugelann, 1792)	NA	100a	<1960	U
			≥1960	
<i>ventralis</i> (Marseul, 1854)	LC	15	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK
			≥1960	V U EK St EH ES LK PS PK Kn
<i>neglectus</i> (Germar, 1813)	EN	80	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Ks
			≥1960	V EH
<i>purpurascens</i> (Herbst, 1792)	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PK KP OP
<i>carbonarius</i> (Hoffmann, 1803)	NA	100	<1960	
			≥1960	U
Hister				
<i>unicolor</i> Linnaeus, 1758	LC	6	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
<i>helluo</i> Truqui, 1852	NE	100*	<1960	
			≥1960	PK
<i>bissexstriatus</i> Fabricius, 1801	RE	100	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK
			≥1960	A EH
<i>funestus</i> Erichson, 1834	LC	20	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH
Atholus				
<i>bimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	NT	40	<1960	V U EK St EH ES PH OP
			≥1960	V U EK EH ES LK EP PH PK
<i>duodecimstriatus</i> (Schrank, 1781)	LC	15	<1960	A V U EK St EH ES PH PS PK KP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK Kn
<i>corvinus</i> (Germar, 1817)	NA	100*	<1960	
			≥1960	

Eblisia*minor* (Rossi, 1792)

LC	10	<1960	A V U	St EH ES	PH PS PK	PeP						
		≥1960	A V U	St EH ES LK	PH PS PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SOL	

Platysoma*compressum* (Herbst, 1783)

NE	100*	<1960										
		≥1960		EK								

deplanatum (Gyllenhal, 1808)

LC	20	<1960	V U	St EH	PH							
		≥1960	A V U	EK St EH ES	PH PS PK	Kn						

angustatum (Hoffmann, 1803)

LC	6	<1960	A V U	St EH ES LK	PH PS PK		PeP					
		≥1960	V U	EK EH ES	EP PH PS PK KP	Kn	OP	PeP				

lineare Erichson, 1834

LC	15	<1960	A V U	St EH ES	PH PS PK		PeP	Ks				
		≥1960	A V U	EK St EH ES	PH PK	Kn	PeP	Ks	SOL			

elongatum (Thunberg, 1787)

RE	100*	<1960	V	St	PH							
		≥1960										KiL

Hololepta*plana* (Sulzer, 1776)

VU	100	<1960	V U	St EH								
		≥1960		EK	ES		PK					

Hydraenidae**Limnebius***truncatellus* (Thunberg, 1794)

LC	6	<1960	A V U	St EH ES	EP PH PS PK							
		≥1960	A V U	EK St EH ES	EP PH PS PK							

crinifer Rey, 1885

VU	100*	<1960	U	EH		PS	PK					
		≥1960										

parvulus (Herbst, 1797)

LC	10	<1960	A V U	St EH ES LK	PH PS PK							
		≥1960	A V U	EK St EH ES	PH PS PK							

nitidus (Marsham, 1802)

NA	100*	<1960	U									
		≥1960										

aluta Bedel, 1881

LC	30	<1960	A V U	EH ES								
		≥1960	A V	EH ES	PH PS PK							

Hydraena*palustris* Erichson, 1837

LC	30	<1960	V	St EH								
		≥1960	A V	EH ES	PS PK							

britteni Joy, 1907

LC	2	<1960	A V U	EK St EH ES LK	PH PS PK		OP	PeP	Ks	KiL		
		≥1960	A V U	EK St EH ES LK EP PH	PS PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	InL	

riparia Kugelann, 1794

LC	10	<1960	A V U	EK St EH ES LK EP PH	PS PK		Kn		Ks			
		≥1960	V U	EK St EH ES LK EP PH	PS PK	Kn						

pulchella Germar, 1824

LC	40	<1960	U	EH ES								
		≥1960	V U	EH								

gracilis Germar, 1824

LC	15	<1960	U	EH		PS	PK			Ks	KiL	
		≥1960	V U	St EH	PH PS	Kn	PeP	Ks	SOL			

excisa Kiesenwetter, 1849

LC	60	<1960								Ks		
		≥1960										InL

Ochthebius*bicolon* Germar, 1824

NE	100*	<1960	A									
		≥1960	A									

czwalinai Kuwert, 1887

LC	40	<1960	A V U									
		≥1960	A V U	EH								

kaninensis Poppius, 1909

NE	100*	<1960										
		≥1960										Ks

minimus (Fabricius, 1792)

LC	10	<1960	A V									
		≥1960	A V U	EK St ES	PK KP	OP						

alpinus (Ilenșteia, 1979)

LC	6	<1960	U	EH		PS	PK	KP	OP		KiL	
		≥1960	U	ES	PH PS PK						Ks	

hungaricus Endrödy-Younga, 1967

NE	40	<1960	V U									
		≥1960	U	EH								

marinus (Paykull, 1798)

LC	30	<1960	A V U	St EH	EP		KP	OP	PeP			
		≥1960	A V U				KP	OP				

Ptiliidae

Ptenidium

Colon

<i>latum</i> Kraatz, 1850	LC	6	<1960	V U EH ES EP PK Ks KiL SoL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PS PK Kn OP Ks KiL
<i>pseudolatum</i> Palm, 1941	LC	30	<1960	U Ks KiL
			≥1960	LK PK Kn OP Ks KiL SoL
<i>rufescens</i> Kraatz, 1850	NE	100*	<1960	V EH KiL EnL InL
			≥1960	
<i>arcticum</i> Munster, 1911	LC	100	<1960	Ks SoL EnL InL
			≥1960	
<i>brundini</i> Palm, 1941	NT	80	<1960	Ks
			≥1960	
<i>curvipes</i> Mäklin, 1881	NT	100	<1960	Ks
			≥1960	
<i>angulare</i> Erichson, 1837	LC	40	<1960	V U EH ES LK
			≥1960	A V U EK EH ES LK PK Kn Ks KiL
<i>dentipes</i> (Sahlberg, 1822)	LC	40	<1960	V U St EH
			≥1960	EK EH OP Ks InL
<i>barnevillei</i> Kraatz, 1858	LC	60	<1960	A V U EH ES
			≥1960	U EH KP Ks
<i>brunneum</i> (Latreille, 1807)	LC	10	<1960	V U EH ES LK PS KP EnL
			≥1960	A V U EK EH ES PH PK KP Kn Ks
<i>appendiculatum</i> (Sahlberg, 1822)	LC	6	<1960	A V U St EH LK PH PS
			≥1960	V U EK St EH ES PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>serripes</i> (Sahlberg, 1822)	LC	10	<1960	A V U St LK
			≥1960	OP PeP EnL
<i>puncticolle</i> Kraatz, 1850	NT	100	<1960	Ks
			≥1960	ES Ks SoL InL
<i>viennense</i> Herbst, 1797	LC	30	<1960	A V U St EH LK PH PS PK
			≥1960	A U EK EH PH PS KP Ks
<i>bidentatum</i> (Sahlberg, 1822)	LC	10	<1960	V U St EH ES LK EP PH PS
			≥1960	PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
Ptomaphagus				
<i>subvillosus</i> (Goeze, 1777)	LC	10	<1960	A V U EH PH
			≥1960	A V U EK EH ES LK PH PK
<i>sericatus</i> (Chaudoir, 1845)	LC	20	<1960	
			≥1960	V U EK EH ES LK
Nemadus				
<i>colonoides</i> (Kraatz, 1851)	LC	20	<1960	A V U EH PH
			≥1960	A V U EH ES PH PS PK Kn OP
Eocatops				
<i>pelopsis</i> (Reitter, 1884)	NE	100*	<1960	
			≥1960	Ks
Nargus				
<i>velox</i> (Spence, 1813)	LC	20	<1960	EH ES PH PS PK
			≥1960	U EK EH ES LK PH PS PK
Choleva				
<i>lederiana</i> Reitter, 1902	LC	4	<1960	V EH PH PK KP Kn KiL
			≥1960	V U EK St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL
<i>oblonga</i> Latreille, 1807	LC	30	<1960	ES
			≥1960	U EK EH ES LK PK
<i>glauca</i> Britten, 1918	LC	6	<1960	U EH
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP Ks
<i>angustata</i> (Fabricius, 1781)	LC	80	<1960	U EH PH
			≥1960	V U EH ES
<i>sturmii</i> Bris. de Barn., 1863	LC	20	<1960	U EH PH PS PK KP
			≥1960	V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn

Nevraphes

<i>angulatus</i> (Müller & Kunze, 1822)	LC	10	<1960	A V U St EH ES LK EP PH					OP					
			≥1960	A V U EK St EH ES LK					PS PK KP					
<i>perssoni</i> Franz, 1975	DD	100	<1960											
			≥1960									Ks		
<i>talparum</i> Lokay, 1920	LC	60	<1960	V U EH										
			≥1960	V U EH										
<i>plicicollis</i> Reitter, 1880	LC	20	<1960	V U										
			≥1960	V U EK EH ES					PS PK					
<i>coronatus</i> J.Sahlberg, 1881	LC	6	<1960		EH		PH	PS	PK	KP	OP	Ks	KiL	InL
			≥1960	V U St EH		EP PH PS	PK KP	Kn	OP PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

Scydmoraphes

<i>sparshalli</i> (Denny, 1825)	DD	100	<1960	V										
			≥1960	V U EH										
<i>helvolus</i> (Schaum, 1844)	NT	100	<1960	V U										
			≥1960	V U ES					PK					
<i>minutus</i> (Chaudoir, 1845)	LC	10	<1960	A V U EH ES		PH	PS							
			≥1960	A V U EK St EH ES		PH	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks		

Stenichnus

<i>scutellaris</i> (Müller & Kunze, 1822)	LC	30	<1960	A V										
			≥1960	A V U EK St EH								Ks		
<i>collaris</i> (Müller & Kunze, 1822)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH	PS	PK	KP	OP						
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn	OP	PeP	Ks							
<i>bicolor</i> (Denny, 1825)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK	PH	PK	KP	OP	PeP	Ks	KiL		InL	
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			

Microscydmus

<i>nanus</i> (Schaum, 1844)	LC	6	<1960	V U St EH ES	PH		KP							
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS	PK	KP	Kn				SoL			
<i>minimus</i> (Chaudoir, 1845)	LC	6	<1960	V U EH										
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK	Kn	OP	PeP	Ks						

Euconnus

<i>claviger</i> (Müller & Kunze, 1822)	LC	30	<1960	V U										
			≥1960	A V U EK EH ES LK	PS	PK	Kn	OP	PeP					
<i>pragensis</i> (Machulka, 1923)	NT	60	<1960	V U St EH										
			≥1960	V U EK EH								Ks		
<i>maklinii</i> (Mannerheim, 1844)	LC	30	<1960	A V U St EH ES										
			≥1960	A V U EK St EH ES	PH	PS	PK	Kn	OP					
<i>wetterhallii</i> (Gyllenhal, 1813)	NT	80	<1960	V U St										
			≥1960	U EK St EH	PH									
<i>rutilipennis</i> (Müller & Kun., 1822)	RE	100*	<1960		EH									
			≥1960											
<i>hirticollis</i> (Illiger, 1798)	LC	10	<1960	A V U St EH ES	PH	PS	KP	OP						
			≥1960	A V U EK St EH LK	PH		OP							
<i>fimetarius</i> (Chaudoir, 1845)	NT	60	<1960	A V U										
			≥1960	A V U EK St EH ES										

Scydmaenus

<i>tarsatus</i> Müller & Kunze, 1822	LC	10	<1960	A V U St EH ES LK EP PH	PS	PK								
			≥1960	A V U EK St EH ES LK	PS	PK	Kn							
<i>rufus</i> Müller & Kunze, 1822	VU	100	<1960	A V U St EH ES			KP	OP						
			≥1960	V U										
<i>hellwigii</i> (Herbst, 1792)	LC	15	<1960	A V U St EH ES										
			≥1960	A V U EK St EH ES	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks				

Silphidae

<i>Necrodes</i>	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH	PS	PK	KP	Kn		Ks				
<i>littoralis</i> (Linnaeus, 1758)			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		

<i>rotundicolle</i> (Sahlberg, 1830)	LC	4	<1960	V U EH ES PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL EnL InL
			≥1960	V U EK St EH LK EP PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL
Arpedium				
<i>quadrum</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	2	<1960	A V U EK EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Eucnecosum				
<i>puncticolle</i> (J.Sahlberg, 1880)	NT	100*	<1960	
			≥1960	
<i>brachypterum</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	1	<1960	V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>tenue</i> (LeConte, 1863)	LC	15	<1960	
			≥1960	
<i>brunnescens</i> (J.Sahlberg, 1871)	LC	6	<1960	
			≥1960	
Acidota				
<i>crenata</i> (Fabricius, 1793)	LC	1	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>cruentata</i> Mannerheim, 1830	LC	10	<1960	V U
			≥1960	V U EK EH ES LK PS PK KP Kn
<i>quadrata</i> (Zetterstedt, 1838)	LC	6	<1960	
			≥1960	
Lesteva				
<i>punctata</i> Erichson, 1839	CR	100	<1960	
			≥1960	
<i>longoelytrata</i> (Goeze, 1777)	LC	15	<1960	A V U EH
			≥1960	A V U EK EH ES PH PS
<i>monticola</i> Kiesenwetter, 1847	NT	100	<1960	
			≥1960	
<i>pubescens</i> Mannerheim, 1830	NT	80	<1960	
			≥1960	
Geodromicus				
<i>plagiatus</i> (Fabricius, 1798)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>longipes</i> (Mannerheim, 1830)	LC	20	<1960	
			≥1960	
Anthophagus				
<i>alpinus</i> (Paykull, 1790)	LC	10	<1960	
			≥1960	
<i>angusticollis</i> (Mannerheim, 1830)	LC	30	<1960	V U St ES LK
			≥1960	EK ES LK PK Kn
<i>omalinus</i> Zetterstedt, 1828	LC	1	<1960	V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Coryphium				
<i>angusticolle</i> Stephens, 1834	LC	4	<1960	V U EH ES PH KP Kn KiL EnL InL
			≥1960	A V U St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Coryphiomorphus				
<i>hyperboreus</i> (Mäklin, 1880)	NT	100	<1960	
			≥1960	
Eudectus				
<i>giraudi</i> Redtenbacher, 1857	LC	15	<1960	
			≥1960	
Boreaphilus				
<i>henningianus</i> Sahlberg, 1832	LC	4	<1960	V U EH PH KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	V U EK St EH EP PH Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Megarthrus

<i>grosseni</i> Schatzmayr, 1904	LC	1 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL
<i>strandi</i> Scheerpeltz, 1931	LC	2 <1960	A V U EH ES PH PS KP OP PeP
		≥1960	V U St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
<i>nigrinus</i> J.Sahlberg, 1876	LC	15 <1960	Kn KiL EnL InL
		≥1960	OP PeP Ks KiL SoL InL
<i>depressus</i> (Paykull, 1789)	LC	1 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>denticollis</i> (Beck, 1817)	LC	1 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL
<i>nitidulus</i> Kraatz, 1857	LC	4 <1960	
		≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
<i>hemipterus</i> (Illiger, 1794)	NA	100 <1960	
		≥1960	U EK ES PS
<i>fennicus</i> Lahtinen, 1938	LC	4 <1960	PK KP
		≥1960	V U EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks EnL
Proteinus			
<i>brachypterus</i> (Fabricius, 1792)	LC	1 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>altaicus</i> Reitter, 1905	LC	10 <1960	
		≥1960	U EK EH EP PK Kn Ks InL
<i>hyperboreus</i> Muona, 1978	LC	60 <1960	
		≥1960	EP Kn Ks KiL EnL InL
<i>laevigatus</i> Hochhuth, 1872	LC	2 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
<i>atomarius</i> Erichson, 1840	LC	10 <1960	PeP Ks
		≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PK KP Kn OP Ks InL
Arrhenopeplus			
<i>tesserula</i> (Curtis, 1828)	LC	15 <1960	V U St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP KiL
		≥1960	V U EK ES LK PK Kn Ks
Micropeplus			
<i>fulvus</i> Erichson, 1840	VU	100 <1960	A V U PH
		≥1960	A V
<i>dokuchaevi</i> Rjabukhin, 1991	NA	100 <1960	
		≥1960	ES
<i>longipennis</i> Kraatz, 1859	NA	100 <1960	
		≥1960	EK
<i>porcatus</i> (Paykull, 1789)	RE	100* <1960	U Kn
		≥1960	
Euplectus			
<i>nanus</i> (Reichenbach, 1816)	LC	60 <1960	A V U St EH ES PS
		≥1960	A V U PK
<i>kirbii</i> Denny, 1825	LC	10 <1960	V U
<i>ssp. revelierei</i> Reitter, 1884		≥1960	A V U EK EH ES LK PH PS PK
<i>piceus</i> Motschulsky, 1835	LC	6 <1960	A V U EH ES PH PK
		≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL
<i>decipiens</i> Raffray, 1910	LC	6 <1960	A V U EH PH
		≥1960	A V U EK EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL
<i>bescidicus</i> Reitter, 1882	LC	20 <1960	A V U Kn PeP
		≥1960	A V U EK EH ES LK PH PS PK
<i>sanguineus</i> Denny, 1825	LC	20 <1960	A V U St EH ES PH
		≥1960	V U EK St EH ES
<i>signatus</i> (Reichenbach, 1816)	LC	10 <1960	PK KiL InL
		≥1960	V U EK EH ES LK EP PH PK OP PeP
<i>lapponicus</i> Löbl & Mattila, 2010	NA	100 <1960	
		≥1960	InL

<i>punctatus</i> Mulsant & Rey, 1861	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL				
<i>karstenii</i> (Reichenbach, 1816)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL				
<i>mutator</i> Fauvel, 1895	LC	6	<1960	U St EH ES PH PK				
<i>Plectophloeus</i>								
<i>nitidus</i> (Fairmaire, 1858)	VU	100	<1960					
			≥1960	V				
<i>Bibloporus</i>								
<i>bicolor</i> (Denny, 1825)	LC	4	<1960	A V U St EH ES PH				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL				
<i>minutus</i> Raffray, 1914	LC	4	<1960	V U EH PH				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL				
<i>Bibloplexus</i>								
<i>tenebrosus</i> (Reitter, 1880)	LC	60	<1960	U				
			≥1960	U PS Kn OP				
<i>spinosus</i> Raffray, 1914	LC	60	<1960	A V U				
			≥1960	A V U EH				
<i>ambiguus</i> (Reichenbach, 1816)	LC	10	<1960	V U St EH ES PH PS Kn Ks				
			≥1960	A V U EK EH ES PH PS PK OP PeP Ks				
<i>minutissimus</i> (Aubé, 1833)	NT	100	<1960					
			≥1960	U EH				
<i>Trimium</i>								
<i>breviceps</i> (Reichenbach, 1816)	LC	6	<1960	A V U St EH ES LK PH PK				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP				
<i>Trichonyx</i>								
<i>sulcicollis</i> (Reichenbach, 1816)	VU	80	<1960					
			≥1960	V U EK EH				
<i>Batrisodes</i>								
<i>venustus</i> (Reichenbach, 1816)	NE	100	<1960					
			≥1960	U				
<i>hubenthali</i> Reitter, 1913	LC	40	<1960					
			≥1960	V U EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks				
<i>buqueti</i> (Aubé, 1833)	EN	100	<1960					
			≥1960	PS				
<i>Bythinus</i>								
<i>macropalpus</i> Aubé, 1833	LC	40	<1960	U				
			≥1960	V U EK EH ES EP PH PK				
<i>Bryaxis</i>								
<i>puncticollis</i> (Denny, 1825)	LC	4	<1960	V U EK EH ES EP PH PS KP Ks KiL				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL				
<i>bulbifer</i> (Reichenbach, 1816)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL				
<i>Tychus</i>								
<i>niger</i> (Paykull, 1800)	LC	15	<1960	A V U EH				
			≥1960	A V U EK EH ES				
<i>Rybaxis</i>								
<i>longicornis</i> (Leach, 1817)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP				
<i>laminata</i> (Motschulsky, 1836)	40	<1960						
			≥1960	A V U EK St EH				
<i>Brachygluta</i>								
<i>fossulata</i> (Reichenbach, 1816)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn				

<i>castaneus</i> (Stephens, 1832)	LC	20	<1960	V U							KP	Kn		PeP							
			≥1960	A V U	St	EH	LK		PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	Sol					
Parabolitobius																					
<i>formosus</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	15	<1960	V U	EK	EH	ES		PH	PS											
			≥1960	U EK	St	EH	ES	LK EP	PS	PK	Kn	OP									
Sepedophilus																					
<i>littoreus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A V U	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK	KP	OP		KiL						
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	InL				
<i>testaceus</i> (Fabricius, 1793)	LC	2	<1960	A V U	St	EH	ES		PH	PS	PK	KP		PeP							
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
<i>marshami</i> (Stephens, 1832)	LC	4	<1960	A V U	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn							
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
<i>constans</i> (Fowler, 1888)	LC	15	<1960	A V U	St	EH			PS												
			≥1960	V U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK		Kn		Ks					
<i>immaculatus</i> (Stephens, 1832)	LC	15	<1960	A V U	St	EH	ES		PH	PS	PK	KP		OP							
			≥1960	A V U	EK		EH	ES	LK	PS	PK		Kn	OP	PeP						
<i>bipunctatus</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	15	<1960	A V U		EH	ES		PH	PS	PK										
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK			PeP						
<i>pedicularius</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A V U	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK										
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	LK EP	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL				
Tachyporus																					
<i>nitidulus</i> (Fabricius, 1781)	LC	4	<1960	A V U	St	EH	ES		PS	PK	KP					KiL					
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP	Kn	PeP	Ks	KiL				
<i>obscurellus</i> Zetterstedt, 1838	LC	4	<1960	V U		EH		LK	PH	PS		KP		OP	PeP	Ks	KiL	Sol	EnL	InL	
			≥1960	V U	EK	St	EH	ES	EP	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	Sol	EnL		
<i>obtusus</i> (Linnaeus, 1767)	LC	2	<1960	A V U	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP		OP		Ks			EnL		
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			EnL	
<i>abdominalis</i> (Fabricius, 1781)	LC	2	<1960	A V U	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	Sol	EnL	InL	
			≥1960	V U		EH		LK EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	Sol	EnL	InL	
<i>solutus</i> Erichson, 1840	LC	40	<1960	A V U		EH	ES	LK		PS											
			≥1960	A V U	EK		ES	LK		PS											
<i>pallidus</i> Sharp, 1871	LC	4	<1960	A V U	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP		KiL	Sol			
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks		EnL		
<i>hypnorum</i> (Fabricius, 1775)	LC	2	<1960	A V U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn							
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP				Ks				
<i>chrysomelinus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A V U		EH	ES		PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL	Sol	EnL		
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	Sol		
<i>dispar</i> (Paykull, 1789)	LC	4	<1960	A V U		EH	ES		PS	PK	KP	Kn		PeP							
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
<i>tersus</i> Erichson, 1839	LC	60	<1960	A V U																	
			≥1960	V U										KP							
<i>atriceps</i> Stephens, 1832	LC	60	<1960	A V U		EH	ES	LK		PS	PK	KP	Kn		OP	PeP	Ks	KiL		EnL	InL
			≥1960	V U		EH	ES		PH			KP	Kn								
<i>quadriscopulatus</i> Pandellé, 1869	LC	40	<1960	A V U		EH	ES											KiL	Sol		
			≥1960	V U	EK		ES	LK											Sol		
<i>transversalis</i> Gravenhorst, 1806	LC	6	<1960	A V U	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL	Sol		InL	
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
<i>pulchellus</i> Mannerheim, 1843	LC	2	<1960	A V U	EK	St	EH	ES	EP	PS	PK	KP	Kn		OP	PeP	Ks	KiL	Sol		
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	LK EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	Sol	InL	
<i>pusillus</i> Gravenhorst, 1806	LC	10	<1960	A V U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	Sol		
			≥1960	A V U	EK	St	EH		LK EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP		KiL	Sol		
<i>scitulus</i> Erichson, 1839	LC	15	<1960										PK								
			≥1960	A V U	EK	St	EH	ES	LK		PS	PK	KP	Kn	PeP	Ks	KiL	Sol			
<i>corpulentus</i> J.Sahlberg, 1876	LC	20	<1960	V U		ES			PH	PS	PK				PeP						
			≥1960	A V U	EK	EH			PH	PS	PK				PeP						

Lamprinodes*saginatus* (Gravenhorst, 1806)

LC	15	<1960	U EH ES PH PS PK OP
		≥1960	V EK St EH ES LK EP PS PK OP

Tachinus*signatus* Gravenhorst, 1802

LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

elegans Eppelsheim, 1893

LC	10	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL

pallipes (Gravenhorst, 1806)

LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

marginatus (Fabricius, 1793)

LC	30	<1960	V U EH ES PH PS PK KP Kn KiL
		≥1960	V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL

scapularis Stephens, 1832

NE	100*	<1960	EH
		≥1960	

proximus Kraatz, 1855

LC	1	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL
		≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

rufipennis Gyllenhal, 1810

LC	20	<1960	V U EH PK KP
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PS PK

atripes J.Sahlberg, 1876

LC	30	<1960	St EH PH PK Kn KiL
		≥1960	

subterraneus (Linnaeus, 1758)

LC	6	<1960	V U EK St EH ES EP PH PS KP
		≥1960	A V U EK St EH ES EP PH KP

fimetarius Gravenhorst, 1802

RE	100	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL SoL
		≥1960	

lignorum (Linnaeus, 1758)

LC	10	<1960	A V U St EH ES EP PK KP OP
		≥1960	A V U St EH ES EP PH PK Kn

basalis Erichson, 1839

LC	10	<1960	PK
		≥1960	EK EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL

corticinus Gravenhorst, 1802

LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP
		≥1960	PeP Ks KiL SoL

laticollis Gravenhorst, 1802

LC	1	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP
		≥1960	PeP Ks KiL SoL

schneideri Luze, 1900

LC	60	<1960	PK
		≥1960	V U EK EH ES LK PH PK

marginellus (Fabricius, 1781)

LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP
		≥1960	PeP Ks KiL SoL

elongatus Gyllenhal, 1810

LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP
		≥1960	PeP Ks KiL SoL

punctipennis (J.Sahlberg, 1876)

RE	100*	<1960	U St EH ES LK
		≥1960	ES

Cilea*silphoides* (Linnaeus, 1767)

LC	6	<1960	A V U St EH ES PH PS
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK KP Kn

exilis (Boheman, 1858)

NA	100	<1960	
		≥1960	EK

Trichophya*pilicornis* (Gyllenhal, 1810)

LC	2	<1960	A V U St EH ES PH PS PK OP Ks
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP

Habrocerus*capillaricornis* (Gravenh., 1806)

LC	40	<1960	V St
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn

Aleochara*curtula* (Goeze, 1777)

LC	6	<1960	A V U EK St EH ES PH PK OP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn

brevipennis Gravenhorst, 1806

LC	4	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL

<i>annularis</i> (Mannerheim, 1830)	LC	1	<1960	A V U St EH ES EP PH PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>flavicornis</i> Kraatz, 1856	LC	20	<1960	A V U EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP
			≥1960	A V U EK EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP
<i>advena</i> Mäklin, 1846	LC	30	<1960	V U EK St EH LK PH PS KP Kn OP PeP
			≥1960	V U EK EH ES LK KP Kn OP PeP
<i>soror</i> Thomson, 1855	LC	4	<1960	A V U St EH ES PS PK EnL InL
			≥1960	A V U EK EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL
<i>formiceticola</i> Märkel, 1841	LC	4	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
<i>rugicollis</i> Kraatz, 1856	LC	60	<1960	U EH PK Ks KiL InL
			≥1960	U EH EP PS PK Kn OP PeP Ks
<i>bicolor</i> Mulsant & Rey, 1853	NT	40	<1960	U EH EP PS PK Kn OP PeP Ks
			≥1960	U EH EP PS PK KP Kn OP PeP Ks
<i>haemorrhoa</i> (Mannerheim, 1830)	LC	2	<1960	A V U St EH ES EP PH PS KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL
Devia				
<i>prospera</i> (Erichson, 1839)	LC	6	<1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP SoL InL
			≥1960	V U EK EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
Hygropora				
<i>cunctans</i> (Erichson, 1837)	LC	20	<1960	A V U EH EP PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL
			≥1960	A V EP PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL
<i>longicornis</i> Palm, 1949	LC	80	<1960	OP Ks KiL InL
			≥1960	OP Ks KiL InL
Pyroglossa				
<i>pulcherrima</i> (Bernhauer, 1901)	NT	100	<1960	
			≥1960	
Acrostiba				
<i>borealis</i> Thomson, 1858	LC	6	<1960	U St EH PH PS PK KP Ks KiL EnL InL
			≥1960	V U St EH PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Ocyusa				
<i>maura</i> (Erichson, 1837)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
<i>picina</i> (Aubé, 1850)	LC	60	<1960	U EP KP OP
			≥1960	U EK St EH EP KP OP
Cephalocousya				
<i>nivicola</i> (Thomson, 1871)	LC	30	<1960	KiL SoL EnL InL
			≥1960	KiL SoL EnL InL
Chilomorpha				
<i>longitarsis</i> (Thomson, 1867)	LC	30	<1960	V EH EP PS PK Sol
			≥1960	V U EH ES LK PH PS PK Sol
Calodera				
<i>nigrita</i> Mannerheim, 1830	LC	20	<1960	V U EP PK KP OP EnL InL
			≥1960	A V U St EP PK KP OP EnL InL
<i>protensa</i> Mannerheim, 1830	NE	100	<1960	
			≥1960	PK
<i>rufescens</i> Kraatz, 1856	NE	100	<1960	
			≥1960	PS
<i>aethiops</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A V U St EH ES LK PH PK KP PeP KiL SoL EnL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
<i>lapponica</i> J.Sahlberg, 1871	LC	80	<1960	KiL EnL InL
			≥1960	PK Ks KiL InL
<i>riparia</i> Erichson, 1837	LC	30	<1960	PeP Ks KiL
			≥1960	A V U EK EH PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>rubens</i> Erichson, 1837	NE	100*	<1960	V
			≥1960	A

Aloconota

<i>fallaciosa</i> (Sharp, 1869)	LC	4	<1960	A	U																	OP	Ks	KiL			InL
<i>palleola</i> (Erichson, 1837)	LC	20	<1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	lnL					
<i>benickiella</i> Brundin, 1948	LC	30	<1960			EK					PH		PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL		EnL	lnL					
<i>wireni</i> Brundin, 1948	NT	100	<1960	A	V	U		EH																Ks	KiL		
<i>amicula</i> (Stephens, 1832)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn							KiL			InL	
<i>pittionii</i> Scheerpeltz, 1950	LC	40	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL						
<i>spatuloides</i> Benick, 1939	LC	20	<1960																				Ks				
<i>inquinula</i> (Gravenhorst, 1802)	VU	60	<1960	V	U		EH	ES	LK																		
<i>excelsa</i> Bernhauer, 1911	LC	20	<1960	V	U		EH	ES																			
<i>subtilis</i> (Scriba, 1866)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL					InL	
<i>nesslingi</i> Bernhauer, 1928	LC	4	<1960	V	U		EH				PH							OP		Ks	KiL					InL	
<i>atomaria</i> (Kraatz, 1856)	NT	100*	<1960				EH																				
<i>glabricula</i> Thomson, 1867	LC	80	<1960																								
<i>indubia</i> (Sharp, 1869)	NA	100	<1960																								
<i>liliputana</i> (Bris. de Barn., 1860)	LC	30	<1960																								
<i>boreella</i> Brundin, 1948	LC	2	<1960	V			EH	ES																			
<i>platonoffi</i> Brundin, 1948	LC	40	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
<i>nitella</i> Brundin, 1948	NA	100	<1960																								
<i>luteipes</i> (Erichson, 1837)	LC	60	<1960	A	V	U	St		ES																		
<i>vilis</i> (Erichson, 1837)	LC	40	<1960	A	V	U																					
<i>zosterae</i> (Thomson, 1856)	LC	20	<1960	A	V	U																					
<i>nigra</i> (Kraatz, 1856)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn		PeP		KiL							
<i>dadopora</i> Thomson, 1867	LC	15	<1960	V	U		EH																				
<i>canescens</i> (Sharp, 1869)	LC	15	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK		PS	PK				OP		Ks	KiL							
<i>sordidula</i> (Erichson, 1837)	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK	KP													
<i>celata</i> (Erichson, 1837)	LC	2	<1960	A	V	U	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP		Kn										
<i>myrmecobia</i> (Kraatz, 1856)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
<i>laticollis</i> (Stephens, 1832)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	LK																	
			>1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			

<i>scapularis</i> (Sahlberg, 1831)	LC	15	<1960	A	U			ES				PK												
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK	KP	Kn									
<i>sodalis</i> (Erichson, 1837)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	SoL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
<i>gagatina</i> (Baudi, 1848)	LC	4	<1960	V	U		St	EH	ES	LK	PH	PS	PK				PeP	Ks						
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
<i>pandionis</i> Scheerpeltz, 1958	LC	60	<1960																					
			≥1960	U		EH										Kn	OP	PeP	Ks	SoL				
<i>pallidicornis</i> (Thomson, 1856)	LC	20	<1960	V	U		St	EH	ES							OP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
<i>hybrida</i> (Sharp, 1869)	NA	100	<1960																					
			≥1960	V																				
<i>trinotata</i> (Kraatz, 1856)	LC	15	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	PeP	Ks	KiL	SoL	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH			KP	OP		Ks					
<i>sparreschneideri</i> Munster, 1923	LC	30	<1960																	Ks	KiL	InL		
			≥1960																Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>subglabra</i> (Sharp, 1869)	LC	30	<1960																					
			≥1960	V	U		EH	ES											Ks					
<i>macrocera</i> (Thomson, 1856)	LC	6	<1960	A	V	U		EH	ES	LK	PH	PS	PK			OP								
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
<i>puncticollis</i> Benick, 1938	LC	60	<1960	A				EH	ES															
			≥1960	A	U		EH			LK	PH			KP										
<i>cauta</i> (Erichson, 1837)	LC	10	<1960	A	V	U		EH	ES		PH		PK	KP			Ks	KiL						
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn		Ks					
<i>ischnocera</i> Thomson, 1870	LC	15	<1960	A	V	U		EH	ES					KP			Ks	KiL				InL		
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES		EP	PH		PK		Kn		Ks					
<i>longicornis</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL	
<i>cribripennis</i> J.Sahlberg, 1890	LC	10	<1960	V	U			EH					PK	KP			OP	PeP	Ks			InL		
			≥1960	V	U		St	EH			PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL		
<i>subsinuata</i> (Erichson, 1839)	LC	30	<1960	A	V	U		EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn			Ks			InL		
			≥1960	A	V	U	St	EH	ES		EP			KP					Ks			InL		
<i>dwinensis</i> Poppius, 1908	LC	15	<1960	A				EH	ES									Ks	KiL					
			≥1960	V	U		St	EH			PH		PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL		InL			
<i>cadaverina</i> (Bris. de Barn., 1860)	LC	20	<1960	A	V	U		EH																
			≥1960	V	U		EK		EH	ES	LK	EP	PS	PK	KP	Kn								
<i>nigripes</i> (Thomson, 1856)	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES		PH	PS	PK	KP			Ks	KiL	SoL		InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks				
<i>marcida</i> (Erichson, 1837)	NT	100	<1960													ES								
			≥1960	A	V																			
<i>europaea</i> Likovský, 1984	LC	10	<1960	A	V	U		EH	ES				PK											
			≥1960	V	U			EH	ES	LK	PH	PS	PK	KP										
<i>cinnamoptera</i> (Thomson, 1856)	LC	1	<1960	A	V	U		St		ES	EP	PH	PS	PK				PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>aeneipennis</i> (Thomson, 1856)	LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>parapicipennis</i> Brundin, 1954	LC	4	<1960					U																
			≥1960	V	U		EK		EH		LK	EP	PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL		EnL	InL	
<i>picipennoides</i> Hanssen, 1932	LC	30	<1960	V	U			ES		EP														
			≥1960	V	U		EK	St	EH	ES	LK	PH		PK			OP		Ks	KiL				
<i>lapponica</i> J.Sahlberg, 1876	LC	15	<1960																	Ks			InL	
			≥1960								PH		PK		Kn				Ks	KiL	SoL		InL	
<i>altaica</i> Bernhauer, 1901	LC	30	<1960																	Ks			EnL	InL
			≥1960																Ks	KiL		EnL	InL	
<i>intermedia</i> (Thomson, 1852)	LC	2	<1960	A	V	U		EH	ES			PK						Ks	KiL				InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		InL	

<i>setigera</i> (Sharp, 1869)	LC	10	<1960	A V U EH ES PH PS PK KP PeP Ks KiL Sol EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH EP PH PK KP OP Ks
<i>laevana</i> (Mulsant & Rey, 1852)	LC	6	<1960	A V U EH ES PH KP Ks KiL Sol
			≥1960	A V U St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP Ks KiL EnL InL
<i>atramentaria</i> (Gyllenhal, 1810)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>hypnorum</i> (Kiesenwetter, 1850)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>laevicauda</i> J.Sahlberg, 1876	LC	40	<1960	KiL EnL InL
			≥1960	OP KiL EnL InL
<i>brunneipennis</i> (Thomson, 1852)	LC	4	<1960	U EH ES PH PS PeP Ks KiL Sol EnL InL
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol InL
<i>castanoptera</i> (Mannerheim, 1830)	LC	80	<1960	
			≥1960	A V U
<i>triangulum</i> (Kraatz, 1856)	NT	80	<1960	
			≥1960	V U EP
<i>xanthopus</i> (Thomson, 1856)	LC	30	<1960	V U EH
			≥1960	A V U EH ES PK KP
<i>graminicola</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>ebenina</i> (Mulsant & Rey, 1873)	LC	30	<1960	EH
			≥1960	V U EK EH ES PK
<i>heymesi</i> Hubenthal, 1913	NE	100*	<1960	
			≥1960	Kn
<i>incognita</i> (Sharp, 1869)	LC	4	<1960	V U EH PH KiL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL
<i>ravilla</i> (Erichson, 1839)	VU	100	<1960	A V U
			≥1960	U
<i>procera</i> (Kraatz, 1856)	LC	4	<1960	A V EH ES
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>basicornis</i> (Mulsant & Rey, 1852)	LC	30	<1960	A V U EH ES
			≥1960	V U EK EH PH Kn Sol
<i>nidicola</i> (Johansen, 1914)	NT	60	<1960	V U St EH KP KiL InL
			≥1960	A V U EP PK Ks
<i>allocera</i> Eppelsheim, 1893	LC	10	<1960	EH ES Kn Ks KiL EnL InL
			≥1960	PK Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>oblita</i> (Erichson, 1839)	NT	100*	<1960	A V U
			≥1960	V U
<i>autumnalis</i> (Erichson, 1839)	VU	100	<1960	V EH
			≥1960	Ks
<i>boletophila</i> (Thomson, 1856)	LC	15	<1960	V U St EH ES PH KP Ks KiL InL
			≥1960	A V U St EH ES LK PH PS PK Ks KiL
<i>diversa</i> (Sharp, 1869)	LC	6	<1960	V U EH KP Ks KiL InL
			≥1960	V U St EH ES EP PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>strandiella</i> Brundin, 1954	LC	10	<1960	A U
			≥1960	A V U EK EH ES PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL
<i>pilicornis</i> (Thomson, 1852)	LC	1	<1960	V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>acutangula</i> Hanssen, 1937	LC	40	<1960	U
			≥1960	V U EH ES EP PS PK Kn PeP KiL
<i>boleticola</i> J.Sahlberg, 1876	LC	4	<1960	V U EH EP PS
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
<i>fungicola</i> (Thomson, 1852)	LC	60	<1960	
			≥1960	V U EH ES LK
<i>crassicornis</i> (Fabricius, 1793)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP KiL EnL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL

<i>fusca</i> (Sahlberg, 1831)	LC	30	<1960											Ks	KiL	EnL	InL								
<i>insecuta</i> (Eppelsheim, 1893)	VU	100	<1960											OP	KiL	SoL	InL								
<i>latifemorata</i> (Brundin, 1940)	NT	100	<1960											Ks											
<i>Boreostiba</i>			>1960														EnL								
<i>frigida</i> (J.Sahlberg, 1880)	NT	60	<1960														EnL InL								
<i>sibirica</i> auct. nec Mäklin, 1880			>1960														EnL InL								
<i>piligeria</i> (J.Sahlberg, 1876)	LC	80	<1960											PK			EnL InL								
<i>thulea</i> (Poppius, 1909)	NT	100*	<1960														InL								
<i>Plataraea</i>			>1960																						
<i>dubiosa</i> (Benick, 1934)	LC	10	<1960	A	V	U		EH																	
			>1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PS	PK	KP									
<i>brunnea</i> (Fabricius, 1798)	LC	60	<1960	A	V	U																			
			>1960	A	V																				
<i>Alevonota</i>																									
<i>gracilenta</i> (Erichson, 1839)	LC	40	<1960		V	U																			
			>1960	V	U	EK	St		LK																
<i>Alianta</i>																									
<i>incana</i> (Erichson, 1837)	LC	6	<1960	A	V	U		EH	ES			PS													
			>1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP		PK	KP	OP									
<i>Trichiusa</i>																									
<i>immigrata</i> Lohse, 1984	LC	10	<1960																						
			>1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		Ks	EnL							
<i>Pachnida</i>																									
<i>nigella</i> (Erichson, 1837)	LC	15	<1960	A		U																			
			>1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK														
<i>Dinaraea</i>																									
<i>angustula</i> (Gyllenhal, 1810)	LC	10	<1960	A	V	U	EK	St		ES		EP													
			>1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PS	PK	Kn		KiL								
<i>aequata</i> (Erichson, 1837)	LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	PeP	Ks	KiL	EnL	InL				
			>1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
<i>linearis</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn		KiL	SoL	InL				
			>1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL				
<i>arcana</i> (Erichson, 1839)	LC	4	<1960		U		St	EH	ES		PH			KP	Kn		PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
			>1960		U		St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL		
<i>Lyprocorrhe</i>																									
<i>anceps</i> (Erichson, 1837)	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	PH			KP				Ks				InL		
			>1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks		SoL	InL		
<i>Nehemitropia</i>																									
<i>lividipennis</i> (Mannerheim, 1830)	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	PH		PK						KiL					
			>1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP							
<i>Acrotona</i>																									
<i>clientula</i> (Erichson, 1839)	RE	100*	<1960	A	V	U		St	EH			PH	PS		Kn		PeP								
			>1960																						
<i>orphana</i> (Erichson, 1837)	LC	30	<1960		V	U		St	EH	ES	EP				Kn			Ks	KiL		EnL	InL			
			>1960	A	V	U	EK	St	EH	ES							OP	PeP	Ks		SoL	InL			
<i>orbata</i> (Erichson, 1837)	LC	15	<1960	A	V	U		St		ES					KP	Kn	OP	PeP					EnL	InL	
			>1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP			PK	KP	Kn	OP	PeP							
<i>fungi</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
			>1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>amplicollis</i> (Mulsant & Rey, 1873)	LC	6	<1960		U																				
			>1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP		PS	PK	KP	Kn		PeP	Ks	KiL					

Leptusa

<i>pulchella</i> (Mannerheim, 1830)	LC	1 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL
<i>norvegica</i> Strand, 1941	LC	20 <1960	A V U PH OP PeP KiL
		≥1960	A V U EK ES PH PK Kn OP PeP Ks
<i>fumida</i> (Erichson, 1839)	LC	15 <1960	A V U EH
		≥1960	A V U EK EH ES PS PK Kn Ks
<i>ruficollis</i> (Erichson, 1839)	LC	40 <1960	A V EH
		≥1960	A V U

Tachyusida

<i>gracilis</i> (Erichson, 1837)	NA	100 <1960	
		≥1960	EH PK

Euryusa

<i>castanoptera</i> Kraatz, 1856	LC	4 <1960	
		≥1960	U EH PH PK PeP
<i>optabilis</i> Heer, 1839	NA	100 <1960	
		≥1960	U St

Thecturota

<i>marchii</i> (Doderö, 1922)	LC	20 <1960	
		≥1960	A V U EH EP PH Kn OP PeP

Pseudomicrodota

<i>paganettii</i> (Bernhauer, 1909)	NA	100 <1960	
		≥1960	U

Silusa

<i>rubiginosa</i> Erichson, 1837	NT	60 <1960	
		≥1960	V U EH LK PS

Anomognathus

<i>cuspidatus</i> (Erichson, 1839)	LC	4 <1960	
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol InL

Homalota

<i>plana</i> (Gyllenhal, 1810)	LC	4 <1960	
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP

Cyphea

<i>curtula</i> (Erichson, 1837)	LC	10 <1960	
		≥1960	A V U EK St EH ES PH PS PK Kn OP PeP Ks

latiuscula Sjöberg, 1934

<i>latiuscula</i> Sjöberg, 1934	LC	20 <1960	
		≥1960	U EK EH PH PK Kn OP PeP Ks

Placusa

<i>complanata</i> Erichson, 1839	LC	10 <1960	
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL InL

depressa Mäklin, 1845

<i>depressa</i> Mäklin, 1845	LC	1 <1960	
		≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol

tachyporoides (Waltl, 1838)

<i>tachyporoides</i> (Waltl, 1838)	LC	2 <1960	
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Sol InL

incompleta Sjöberg, 1934

<i>incompleta</i> Sjöberg, 1934	LC	4 <1960	
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL

cibrata Johnson & Lundberg, 1977

<i>cibrata</i> Johnson & Lundberg, 1977	LC	30 <1960	
		≥1960	EH PK Kn OP PeP Ks Sol

suecica Johnson & Lundberg, 1977

<i>suecica</i> Johnson & Lundberg, 1977	LC	15 <1960	
		≥1960	V U St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks Sol

atrata (Mannerheim, 1830)

<i>atrata</i> (Mannerheim, 1830)	LC	2 <1960	
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Sol InL

adscita Erichson, 1839

<i>adscita</i> Erichson, 1839	NE	100* <1960	
		≥1960	

<i>intermedia</i> Erichson, 1837	LC	2	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn Ks KiL InL					
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL					
<i>kraatzi</i> Sharp, 1871	LC	15	<1960						
			≥1960						
<i>hyperborea</i> Strand, 1943	LC	40	<1960						
			≥1960						
<i>brevicornis</i> (Matthews, 1838)	NT	40	<1960	V					
			≥1960	V U St EH ES PH PK					
<i>gracilis</i> (Matthews, 1838)	LC	40	<1960	A V U EH ES PH					
			≥1960	V U EK EH ES PH PK OP PeP					
<i>minuta</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	4	<1960	A V U St EH ES PH PS Kn Ks					
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL					
Gymnusa									
<i>brevicollis</i> (Paykull, 1800)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL					
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL					
<i>variegata</i> Kiesenwetter, 1845	LC	10	<1960						
			≥1960						
Deinopsis									
<i>erosa</i> (Stephens, 1832)	LC	6	<1960	V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL					
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH PK Kn PeP Ks KiL InL					
Scaphidium									
<i>quadrimaculatum</i> Olivier, 1790	LC	10	<1960	V U EH ES PH					
			≥1960	V U EK EH ES LK PH PS PK					
Scaphisoma									
<i>agaricinum</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP KiL InL					
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL					
<i>inopinatum</i> Löbl, 1967	LC	10	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP					
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks					
<i>boleti</i> (Panzer, 1793)	LC	20	<1960	A V U EH					
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PK Kn OP					
<i>subalpinum</i> Reitter, 1880	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP					
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL					
<i>balcanicum</i> Tamanini, 1954	RE	100*	<1960	V U					
			≥1960	U					
<i>boreale</i> Lundblad, 1952	LC	4	<1960	A V U St EH LK PS					
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks					
<i>assimile</i> Erichson, 1845	LC	20	<1960	V U EH ES EP PH PS PK					
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK PeP					
Syntomium									
<i>aeneum</i> (Müller, 1821)	LC	2	<1960	V U EH PH PS KP Kn Ks					
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL					
Deleaster									
<i>dichrous</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	10	<1960	U					
			≥1960	A V U EK St EH PH PK KP Kn Ks					
Coprophilus									
<i>striatulus</i> (Fabricius, 1793)	LC	6	<1960	V U					
			≥1960	A V U EK EH ES PH PS PK					
Ochthephilus									
<i>omalinus</i> (Erichson, 1840)	LC	60	<1960						
			≥1960	ES LK PS OP Ks InL					
<i>strandi</i> (Scheerpeltz, 1950)	LC	60	<1960						
			≥1960	Ks EnL InL					
Thinobius									
<i>munsteri</i> Scheerpeltz, 1959	NT	100	<1960						
			≥1960	InL					
<i>ciliatus</i> Kiesenwetter, 1844	LC	80	<1960						
			≥1960	PeP Ks KiL SoL InL					

<i>assequens</i> Rey, 1884	LC	40	<1960	V U St EH EP PH PS Kn PeP Ks KiL				
			≥1960	V St Kn OP PeP Ks KiL				
<i>circularis</i> Gravenhorst, 1802	LC	60	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP				
			≥1960	A V U EK EH ES PH PeP				
<i>pumilio</i> Erichson, 1839	LC	10	<1960	A V U St EH ES PH PS PK Kn Ks InL				
			≥1960	A V U St EH ES PH PS PK KP Kn Ks				
<i>humilis</i> Erichson, 1839	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP				
			≥1960	V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn				
<i>carbonarius</i> Gyllenhal, 1827	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL				
<i>hyperboreus</i> J.Sahlberg, 1876	LC	60	<1960				KiL	EnL InL
			≥1960				SoL	EnL InL
<i>scabriculus</i> J.Sahlberg, 1876	LC	10	<1960	A V U St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL				
			≥1960	A V U St EH ES PH PS PK KP Kn OP Ks Sol				
<i>opticus</i> Gravenhorst, 1806	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL EnL				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL				
<i>crassus</i> Stephens, 1833	LC	4	<1960	A V U EH ES LK EP PH PS PK Ks KiL SoL EnL InL				
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PK KP PeP Sol				
<i>formicetorum</i> Mannerheim, 1843	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES EP PS PK KP Kn Ks KiL SoL InL				
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PS PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL				
<i>intermedius</i> Rey, 1884	LC	15	<1960	A V U EH PS PK OP EnL InL				
			≥1960	A V U EK EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL				
<i>brunnipes</i> Stephens, 1833	LC	20	<1960					
			≥1960	V U EK EH ES LK				
<i>nigritulus</i> Gyllenhal, 1827	NT	40	<1960	A V U EH ES LK PH PS PK KP Ks KiL				
			≥1960	A V U ES				
<i>latifrons</i> Erichson, 1839	LC	80	<1960	A U EH EP				
			≥1960	A U St EH EP PK				
<i>fulvicornis</i> Stephens, 1833	LC	30	<1960	A V U EK EH ES				
			≥1960	V U EK EH ES LK EP PH PS PK KP Kn				
<i>tarsalis</i> Ljungh, 1804	LC	30	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL				
			≥1960	V U EK EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL Sol InL				
<i>bohemicus</i> Machulka, 1947	LC	10	<1960	U				
			≥1960	A U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks				InL
<i>similis</i> (Herbst, 1784)	LC	10	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP PeP Ks Sol				
<i>cicindeloides</i> (Schaller, 1783)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP				
<i>kiesenwetteri</i> Rosenhauer, 1856	NA	100	<1960					
			≥1960	V				
<i>fornicatus</i> Stephens, 1833	LC	10	<1960	A V U St EH ES LK EP PS PK PeP				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PeP				
<i>pallitarsis</i> Stephens, 1833	LC	10	<1960	V U St EH ES LK EP PH PS PK Kn PeP Ks KiL InL				
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PK Kn OP PeP Ks KiL Sol				
<i>niveus</i> Fauvel, 1865	LC	6	<1960	U EH ES LK PH PS PK Ks KiL EnL InL				
			≥1960	U EK St EH EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL Sol EnL InL				
<i>binotatus</i> Ljungh, 1804	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL				
<i>pubescens</i> Stephens, 1833	LC	20	<1960	V U EH LK Ks InL				
			≥1960	V U EH EP PH PK KP Kn Ks KiL Sol				
<i>umbratilis</i> Casey, 1884	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL				InL
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL				
<i>flavipes</i> Stephens, 1833	LC	6	<1960	A V U St EH ES				
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK				
<i>audax</i> J.Sahlberg, 1900	VU	100	<1960				InL	
			≥1960				InL	

bifoveolatus Gyllenhal, 1827	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks Kil Sol EnL InL
impressus Germar, 1824	LC	10	<1960	A V U St EH ES PK Kn EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK KP Kn PeP Ks Kil Sol EnL InL
ludyi Fauvel, 1886	LC	15	<1960	V U EH ES PH PS PK OP Ks Kil Sol InL
			≥1960	A V U EK EH PK KP Kn PeP Kil Sol EnL InL
palustris Erichson, 1839	LC	1	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
flavipalpis Thomson, 1860	LC	2	<1960	A V U St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
geniculatus Gravenhorst, 1806	LC	6	<1960	A V U St EH ES PH PS PK KP OP PeP Ks Kil EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
pallipes Gravenhorst, 1802	LC	80	<1960	V U
			≥1960	A V U
noctivagus Casey, 1884	VU	100*	<1960	Kil EnL InL
			≥1960	
Dianous				
coerulescens (Gyllenhal, 1810)	LC	20	<1960	V U St EH ES PH PS PK Kn Ks
			≥1960	V U EK St EH ES PH PS Kn
Euaesthetus				
ruficapillus (Lacordaire, 1835)	LC	6	<1960	V U St EH ES PH KP Kn PeP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS KP Kn OP Kil
laeviusculus Mannerheim, 1844	LC	10	<1960	V U St EH ES PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL
			≥1960	A U EK ES EP PH PS PK Kn OP Ks Kil
bipunctatus (Ljungh, 1804)	LC	6	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol InL
Paederus				
riparius (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks Kil
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP
fuscipes Curtis, 1826	LC	20	<1960	A V U St KP
			≥1960	A V U EK St KP
Astenus				
procerus (Gravenhorst, 1806)	NT	60	<1960	A V U EK ES
			≥1960	A V U EK St ES LK PK
pulchellus (Heer, 1839)	LC	10	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK OP Ks
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP
gracilis (Paykull, 1789)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK OP Ks
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP
Iyonessius (Joy, 1908)	NE	100	<1960	EH
			≥1960	U
Rugilus				
fragilis (Gravenhorst, 1806)	LC	10	<1960	V U St EH ES PS
			≥1960	V U EK St EH ES LK PH PS PK
rufipes Germar, 1836	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES PH PK
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH
orbiculatus (Paykull, 1789)	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK KP
erichsonii (Fauvel, 1867)	LC	60	<1960	A V U ES LK
			≥1960	V U EK ES LK PK
similis (Erichson, 1839)	LC	60	<1960	V U St EH ES LK EP PH PS PK PeP
			≥1960	V U EH ES PH PK
Medon				
apicalis (Kraatz, 1857)	LC	20	<1960	EH ES PH
			≥1960	A V U EK St EH LK PK
Pseudomedon				
obsoletus (Nordmann, 1837)	NA	100*	<1960	U
			≥1960	

<i>intermedius</i> Donisthorpe, 1936	LC	4 <1960	V U St EH LK PH PK OP KiL SoL InL
<i>batychrus</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	20 <1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL SoL InL
		≥1960	A V U EK St EH EP PH PS PK KP Kn
Phacophallus			
<i>parumpunctatus</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	40 <1960	V U St EH ES PH KP
		≥1960	A V U EK EH ES EP PH PK
Gauropterus			
<i>fulgidus</i> (Fabricius, 1787)	LC	40 <1960	V U St EH ES PH
		≥1960	V U EK EH PH
Gyrohypnus			
<i>punctulatus</i> (Paykull, 1789)	LC	6 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks
<i>fracticornis</i> (Müller, 1776)	LC	10 <1960	A V U St EH ES PH PS Kn
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PK KP Ks
<i>angustatus</i> Stephens, 1833	LC	2 <1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP SoL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Ks Kil EnL
<i>atratus</i> (Heer, 1839)	LC	10 <1960	A V U St EH ES PH KP
		≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK Kn OP PeP Ks
Nudobius			
<i>lentus</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	2 <1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn PeP Ks Kil Sol
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Sol
Hypnogyra			
<i>glabra</i> (Nordmann, 1837)	VU	100 <1960	
		≥1960	V
Xantholinus			
<i>linearis</i> (Olivier, 1795)	LC	4 <1960	A V U St EH ES LK PH PS PK
		≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP OP
<i>longiventris</i> Heer, 1839	LC	20 <1960	V U ES LK EP
		≥1960	A V U EH ES
<i>gallicus</i> Coiffait, 1956		60 <1960	
		≥1960	U ES
<i>tricolor</i> (Fabricius, 1787)	LC	2 <1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil
<i>laevigatus</i> Jacobsen, 1847	LC	6 <1960	V U EH ES PS PK Kn
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks
Othius			
<i>punctulatus</i> (Goeze, 1777)	LC	4 <1960	V U St EH ES LK EP PH PS PK KP OP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn
<i>lapidicola</i> Kiesenwetter, 1848	LC	4 <1960	V U St EH ES PH PK KP Kn PeP Ks Kil SoL EnL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks Kil SoL EnL InL
<i>angustus</i> Stephens, 1833	LC	30 <1960	A U EH PeP Kil EnL
		≥1960	A V U St EH ES OP PeP Ks Kil SoL EnL InL
<i>volans</i> J.Sahlberg, 1876	LC	30 <1960	V U ES PS Ks
		≥1960	V U St EH ES EP PK Kn PeP Ks
<i>subuliformis</i> Stephens, 1833	LC	2 <1960	A V U St EH PH PK KP OP PeP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks
Atrecus			
<i>pilicornis</i> (Paykull, 1790)	LC	2 <1960	V U St EH PH PS PK Kn OP PeP Ks Kil InL
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
<i>affinis</i> (Paykull, 1789)	LC	6 <1960	A V U St EH ES PH PK
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
<i>longiceps</i> (Fauvel, 1873)	LC	15 <1960	V U St EH PH PeP
		≥1960	V U EK EH ES PH PS PK KP OP PeP Ks
Erichsonius			
<i>cinerascens</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	4 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks

Gabronthus

<i>carbonarius</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Sol		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks		
<i>alpinus</i> Eppelsheim, 1875	NT	100	<1960			
			≥1960	A LK		
<i>albipes</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL Sol InL		
<i>caucasicus</i> Nordmann, 1837	EN	100*	<1960	V U		
			≥1960	ES		
<i>ebeninus</i> (Gravenhorst, 1802)	RE	100*	<1960	V U EH PS PK KP		
			≥1960			
<i>concinnus</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PS PK KP Kn OP		
<i>debilis</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	2	<1960	V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP KiL Sol		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks KiL InL		
<i>splendens</i> (Fabricius, 1793)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn PeP Ks InL		
<i>punctus</i> (Gravenhorst, 1802)	RE	100*	<1960	V U		
			≥1960			
<i>fumarius</i> (Gravenhorst, 1806)	NE	100	<1960	EH		
			≥1960	A EH		
<i>umbratilis</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	4	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS KP		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK OP		
<i>nigrita</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	2	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol InL		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol		
<i>laevicollis</i> (Lacordaire, 1835)	NA	100	<1960			
			≥1960	LK		
<i>longicornis</i> Stephens, 1832	LC	60	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK Kn Ks		
			≥1960	V U EK EH ES EP Ks		
<i>parvicornis</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	30	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP Ks		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PK OP Ks		
<i>rubripennis</i> Stephens, 1832	LC	10	<1960	V U St EH ES LK PH PS PK		
			≥1960	V U EK EH ES LK PH PS PK		
<i>furcifer</i> Renkonen, 1937	LC	20	<1960	V U EH OP PeP Ks Kil Sol		
			≥1960	A V U EH PH KP OP Ks		
<i>micans</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	20	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP		
<i>micantoides</i> Benick & Lohse, 1956	LC	4	<1960			
			≥1960	A V U EK St EH LK PS PK KP Kn OP PeP		
Neobisnius						
<i>vilosulus</i> (Stephens, 1833)	LC	80	<1960	U		
			≥1960	U EK EH		
<i>lathrobioides</i> (Baudi, 1848)	LC	20	<1960	U St EH		
			≥1960	A V U EK EH ES PH PK Sol		
<i>procerulus</i> (Gravenhorst, 1806)	NA	100*	<1960	U		
			≥1960			
Cafius						
<i>xantholoma</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	30	<1960	A V U		
			≥1960	A V U EK		
Dinothenarus						
<i>pubescens</i> (DeGeer, 1774)	VU	60	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP		
			≥1960	V U EK EH ES LK PH PS Kn		
Ontholestes						
<i>tessellatus</i> (Geoffroy, 1785)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL EnL InL		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL		
<i>murinus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Kil SoL InL		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PS PK Kil InL		

Platydracus

<i>fulvipes</i> (Scopoli, 1763)	LC	15	<1960	V U EH ES LK PK Kn PeP							
			≥1960	V U EK St EH ES LK PS PK Kn PeP Ks Kil Sol							
<i>stercorarius</i> (Olivier, 1795)	LC	10	<1960	A V U St EH ES EP PS PK							
			≥1960	V U EK St EH ES LK PK Kn							
<i>latebricola</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	20	<1960	V U St EH ES PH PS PK KP							
			≥1960	V U EK St EH ES LK PH PS PK Kn							

Staphylinus

<i>erythropterus</i> Linnaeus, 1758	LC	4	<1960	V U EK EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP							
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol							
<i>caesareus</i> Cederhjelm, 1798	LC	20	<1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP							
			≥1960	V U EK St EH ES LK							
<i>dimidiaticornis</i> Gemminger, 1851	NA	100	<1960								
			≥1960	A							

Ocypus

<i>ophthalmicus</i> (Scopoli, 1763)	LC	20	<1960	A V U EK St EH ES LK							
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PK							
<i>nitens</i> (Schrank, 1781)	NT	80	<1960		ES						
			≥1960	A U EK ES							
<i>brunnipes</i> (Fabricius, 1781)	LC	30	<1960	V U							
			≥1960	V U EK EH ES LK							
<i>fuscatus</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL							
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol							
<i>picipennis</i> (Fabricius, 1793)	LC	40	<1960	A V U EK St EH ES PS PK							
			≥1960	A V U EK St EH ES LK							
<i>fulvipennis</i> Erichson, 1840	LC	20	<1960	V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP							
			≥1960	V U EK St EH ES LK PH PK KP Kn							
<i>aeneocephalus</i> (DeGeer, 1774)	EN	80	<1960	A V U EH ES PS							
			≥1960	A V U St EH EP							

Tasgius

<i>ater</i> (Gravenhorst, 1802)	VU	60	<1960	A V U St EH PH							
			≥1960	A V U EK							
<i>morsitans</i> (Rossi, 1790)	NA	100	<1960								
			≥1960	U							
<i>melanarius</i> (Heer, 1839)	NT	60	<1960	A V U EK ES							
			≥1960	A							

Creophilus

<i>maxillosus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL							
			≥1960	A V U EK St EH EP PH PS PK							

Heterothops

<i>stiglundbergi</i> Israelson, 1979	LC	20	<1960								
			≥1960	A V U EK St EH EP PK Kn							
<i>praevius</i> Erichson, 1839	RE	100*	<1960	A V U St PH PS PK KP							
			≥1960								
<i>niger</i> Kraatz, 1868	NE	100	<1960								
			≥1960								
<i>quadripunctulus</i> (Gravenh., 1806)	LC	15	<1960	A V U St EH OP Ks Kil							
			≥1960	A V U EK ES LK PK Kn OP PeP Ks Kil Sol							

Eurychorus

<i>picipes</i> (Paykull, 1800)	LC	10	<1960	A V U EH ES PH PK KP							
			≥1960	V U EK St EH ES LK PH PK Kn PeP Ks Kil Sol							

Velleius

<i>dilatatus</i> (Fabricius, 1787)	NA	40	<1960								
			≥1960	V U EK ES LK PS PK							

Quedius

<i>longicornis</i> Kraatz, 1857	LC	30	<1960								
			≥1960	V U EK St EH ES LK PK							

<i>fulgidus</i> (Fabricius, 1793)	RE	100	<1960														KiL						
			≥1960													EP							
<i>mesomelinus</i> (Marsham, 1802)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	PeP	KiL					
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	InL		
<i>maurus</i> (Sahlberg, 1830)	LC	4	<1960	V	U		St	EH			PH	PS	PK	KP									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP				
<i>cruentus</i> (Olivier, 1795)	LC	20	<1960	A	V	U			EH	ES		PH	PS	PK									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK								
<i>brevicornis</i> (Thomson, 1860)	LC	15	<1960	V	U																		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks			
<i>puncticollis</i> (Thomson, 1867)	VU	100	<1960		U			EH															
			≥1960		U																		
<i>brevis</i> Erichson, 1840	LC	4	<1960	A	V	U		St	EH	ES		PH	PS	PK	KP					KiL	InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		
<i>vexans</i> Eppelsheim, 1881	NA	100	<1960																				
			≥1960		U					LK													
<i>microps</i> Gravenhorst, 1847	NT	30	<1960	V	U																		
			≥1960	V	U	EK		EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn							
<i>lundbergi</i> Palm, 1972	VU	60	<1960																				
			≥1960													PK	Kn	OP	PeP	Ks			
<i>tenellus</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	4	<1960	V	U			EH			EP	PH			KP								
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL			
<i>scitus</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	10	<1960	A	V	U		St	EH	ES		PH	PS	PK									
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK									
<i>xanthopus</i> Erichson, 1839	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		
<i>cinctus</i> (Paykull, 1790)	LC	20	<1960	A	V	U		St	EH	ES	EP	PH			KP	Kn							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH		PK									
<i>plagiatus</i> Mannerheim, 1843	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL
<i>fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL
<i>curtipennis</i> Bernhauer, 1908	LC	10	<1960	A	V	U			EH			PS											
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK			PK									
<i>subunicolor</i> Korge, 1961	LC	30	<1960						EH													InL	
			≥1960	A	V							PS	PK	KP									
<i>molochinus</i> (Gravenhorst, 1806)	LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	EnL	EnL
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL
<i>lucidulus</i> Erichson, 1839	LC	6	<1960	A	V	U			EH														
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	KP	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	EnL
<i>picipes</i> (Mannerheim, 1830)	NT	80	<1960	V	U				ES														
			≥1960	A	V	U																	
<i>nemoralis</i> Baudi, 1848	NE	100	<1960		U																		
			≥1960	V		EH																	
<i>umbrinus</i> Erichson, 1839	LC	6	<1960	A	V	U		St	EH	ES		PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	EnL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL
<i>fumatus</i> (Stephens, 1833)	NE	100*	<1960																				
			≥1960													EH							
<i>sublimbatus</i> Mäklin, 1853	LC	40	<1960																				
			≥1960																				
<i>nigriceps</i> Kraatz, 1857	LC	60	<1960	V																			
			≥1960	A	V	U			EH		EP												
<i>pseudolimbatus</i> Strand, 1938		80	<1960																				
			≥1960																				
<i>limbatus</i> (Heer, 1834)	LC	4	<1960	V	U		St	EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	KiL			InL		
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	FP	PH	PS	PK	KP	KP	Kn	OP					

<i>fellmani</i> (Zetterstedt, 1838)	LC	30	<1960																KiL	EnL	InL						
<i>nitipennis</i> (Stephens, 1833)	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL		KiL	EnL	InL					
<i>persimilis</i> Mulsant & Rey, 1876	NA	100	<1960																								
<i>fulvicollis</i> (Stephens, 1833)	LC	4	<1960	A	V	U	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL					
<i>boopoides</i> Munster, 1923	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL					
<i>boops</i> (Gravenhorst, 1802)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL					
<i>≥1960</i>				A	V	U	St	EH	ES	LK	EP		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL					
Acylophorus																											
<i>wagenschieberi</i> Kiesenw., 1850	LC	15	<1960							PS	PK																
<i>≥1960</i>										V	U	EK	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK								
Atanygnathus																											
<i>terminalis</i> (Erichson, 1839)	RE	100*	<1960																								
<i>≥1960</i>																											
Lucanidae																											
Ceruchus																											
<i>chrysomelinus</i> (Hochenw., 1785)	EN	60	<1960							EP	PH	PS			Kn												
<i>≥1960</i>										V	U	St	EH			PH	PK										
Sinodendron																											
<i>cylindricum</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960							EP	PH	PS	PK	KP													
<i>≥1960</i>										A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	PS	PK								
Platycerus																											
<i>caprea</i> (DeGeer, 1774)	LC	2	<1960							EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks									
<i>≥1960</i>										A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	OP	PeP	Ks	KiL	SoL					
<i>caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	NT	40	<1960							PS	PK																
<i>≥1960</i>										A	V	U	EK		EH	ES											
Trogidae																											
Trox																											
<i>sabulosus</i> (Linnaeus, 1758)	CR	100	<1960							PH	PS	PK															
<i>≥1960</i>										V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK							
<i>scaber</i> (Linnaeus, 1767)	LC	15	<1960																								
<i>≥1960</i>										A	V	U	EK		EH	ES	LK	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP			
Geotrupidae																											
Geotrupes																											
<i>stercorarius</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960							EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks									
<i>≥1960</i>										A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn				
<i>stercorosus</i> (Scriba, 1791)	LC	2	<1960							PS	PK	KP	Kn														
<i>≥1960</i>										A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	
<i>vernalis</i> (Linnaeus, 1758)	RE	100*	<1960							PS	PK	KP	Kn	OP	PeP												
<i>≥1960</i>										A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK						
Scarabaeidae																											
Aegialia																											
<i>arenaria</i> (Fabricius, 1787)	VU	80	<1960							EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks									
<i>≥1960</i>										V	U																
<i>sabuleti</i> (Panzer, 1797)	LC	10	<1960							EP			PK	KP		OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL					
<i>≥1960</i>										A	U	EK	St	EH		EP		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
Aphodius																											
<i>erraticus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	20	<1960							EP			PK														
<i>≥1960</i>										V	U	EK		EH	ES		EP		PK								
<i>subterraneus</i> (Linnaeus, 1758)	EN	80	<1960							PH	PS	PK	KP		OP												
<i>≥1960</i>										A	U	EK		EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP		OP				

<i>rufus</i> (Moll, 1782)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP	OP PeP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn	Ks
<i>ictericus</i> (Laicharting, 1781)	EN	60	<1960	A V U EH EP PK KP	
			≥1960	A V U EK ES	
<i>niger</i> (illiger, 1798)	VU	40	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP	
			≥1960	A V U EK EH EP KP	
<i>plagiatus</i> (Linnaeus, 1767)	VU	60	<1960	A V U St EH ES LK PS PK	
			≥1960	A V U EK PH	
<i>lividus</i> (Olivier, 1789)	RE	100*	<1960	A U ES	
			≥1960		
<i>granarius</i> (Linnaeus, 1767)	NT	80	<1960	V U	
			≥1960	V U EK	
Euheptaaulacus					
<i>villosus</i> (Gyllenhal, 1806)	VU	100	<1960	A V U	
			≥1960	V EH	
Oxyomus					
<i>sylvestris</i> (Scopoli, 1763)	LC	80	<1960	V U	
			≥1960	U EK LK	
Psammodius					
<i>asper</i> (Fabricius, 1775)	VU	100	<1960	U St	
			≥1960	V U	Ks
Onthophagus					
<i>nuchicornis</i> (Linnaeus, 1758)	RE	100*	<1960	A V U St EH ES PH PS PK Kn	
			≥1960		
<i>gibbulus</i> (Pallas, 1781)	CR	100	<1960	V U EH	
			≥1960	U EH	
<i>fracticornis</i> (Preyssler, 1790)	RE	100*	<1960	V U EH ES PS	
			≥1960		
Serica					
<i>brunnea</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK	
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn	
Amphimallon					
<i>solstitiale</i> (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP	
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK	
Melolontha					
<i>hippocastani</i> Fabricius, 1801	LC	6	<1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn	
			≥1960	V U EK St EH ES LK PH PS PK Kn OP	
<i>melolontha</i> (Linnaeus, 1758)	i	<1960			
		≥1960			
Anomala					
<i>dubia</i> (Scopoli, 1763)	LC	6	<1960	V U EK St EH ES LK EP PS PK KP OP	
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP	
Phyllopertha					
<i>horticola</i> (Linnaeus, 1758)	LC	20	<1960	V U EK EH ES LK PH PS PK	
			≥1960	EH ES LK PH PS PK	
Oryctes					
<i>nasicornis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A V U EK EH ES EP	
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP	
Oxythyrea					
<i>funesta</i> (Poda, 1761)	LC	60	<1960		
			≥1960	EK EH ES LK PK	
Cetonia					
<i>aurata</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP	
			≥1960	A V U EK St FH FS IK PH PS PK	

Protaetia*marmorata* (Fabricius, 1792)**VU**

40 <1960 A V U St EP PH PS KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL

≥1960 V U EK EH ES LK PS PK

cuprea (Fabricius, 1775)**LC**

1 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL

≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Osmoderma*coriarium* (DeGeer, 1774)**VU**

100 <1960 V

≥1960 V

Trichius*fasciatus* (Linnaeus, 1758)**LC**

1 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL

≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Eucinetidae**Eucinetus***haemorrhoidalis* (Germar, 1818)**LC**

10 <1960 U ES LK PS PK

≥1960 A V U EK St EH ES LK PH PS PK OP

Euclodes*caucasicus* (Reitter, 1880)**LC**

40 <1960 PH

≥1960 EH PH PK Kn Ks

Clambidae**Calyptomerus***dubius* (Marsham, 1802)

i <1960 i

≥1960

Clambus*pubescens* Redtenbacher, 1849**LC**

6 <1960 A V U St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP KiL InL

≥1960 V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL

lohsei Meybohm, 2004

4 <1960

≥1960 V U EK EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP

punctulum (Beck, 1817)**LC**

4 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL

≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol

gibbulus (LeConte, 1850)**LC**

60 <1960 U ES KP

≥1960 V U EK EH ES PS PK

armadillo (DeGeer, 1774)**LC**

6 <1960 A V U EH ES KP OP

≥1960 V U EK St EH LK PH PS PK OP PeP

nigrellus Reitter, 1914**LC**

60 <1960 V U St EH PS

≥1960 V U St EH ES

Scirtidae**Elodes***minuta* (Linnaeus, 1767)**LC**

15 <1960 V U St EH Ks

≥1960 V U EK St EH ES PS PK Kn KiL

elongata Tournier, 1868**NT**

60 <1960 V U EH

≥1960 V U EH ES PS

Microcara*testacea* (Linnaeus, 1767)**LC**

4 <1960 A V U EK St EH ES LK PH PS PK Kn OP Ks

≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Sol

Cyphon*coarctatus* Paykull, 1799**LC**

2 <1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK Kn

≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL

palustris Thomson, 1855**LC**

6 <1960 V U St EH EP PH PS PK KP Ks

≥1960 V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL

kongsbergensis Munster, 1924**LC**

2 <1960 A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol

≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL

ochraceus Stephens, 1830**LC**

10 <1960 A V U St EH ES LK PH PS

≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP

variabilis (Thunberg, 1785)**LC**

1 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL

formaneki Jacobson, 1913	LC	30	<1960	□ □
			≥1960	□ □ U St EH ES □ □ PH PK □ □ OP □ □ Sol □ □
Chrysobothris				
chrysostigma (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	□ □ V U St EH ES □ □ EP PH PS PK KP □ □ OP PeP Ks KiL Sol □ □
			≥1960	□ □ V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol □ □
Agrilus				
ater (Linnaeus, 1767)	VU	60	<1960	□ □ V U □
			≥1960	□ □ U □ □ EH □
laticornis (Illiger, 1803)	VU	100*	<1960	□ □ U □
			≥1960	□ □ U □
sulcicollis Lacordaire, 1835	NT	80	<1960	□ □ V U □ □ EH □
			≥1960	□ □ V □
mendax Mannerheim, 1837	LC	30	<1960	□ □ V U □ □ St EH □
			≥1960	□ □ V U □ □ EH ES □ □ PH □
subauratus Gebler, 1833	LC	60	<1960	□ □ V U □ □ St EH □
			≥1960	□ □ U EK □ □ EH ES □ □ PK □
pratensis (Ratzeburg, 1837)	LC	40	<1960	□ □ V U EK □ □ EH ES □
			≥1960	□ □ V U □ □ EH ES LK □
pseudocyanus Kiesenw., 1857	CR	100*	<1960	□ □
			≥1960	□ □
delphinensis auct. nec Abeille de Perrin, 1897				
betuleti (Ratzeburg, 1837)	LC	30	<1960	□ □ V U EK □ □ ES □
			≥1960	□ □ V U EK St EH ES LK □ □ PH PK □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
integerimus (Ratzeburg, 1837)	EN	100	<1960	□ □ V □ □ EH □
			≥1960	□ □ V □ □ EH ES □
viridis (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	□ A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP □ □ OP PeP Ks KiL □ □
			≥1960	□ V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP □ □ OP PeP KiL □ InL
cuprescens Ménétriés, 1832	NE	100	<1960	□ V □ □ ES □
			≥1960	□ V □
paludicola Krogerus, 1922	LC	4	<1960	□ V U □ □ St EH ES □ □ PH □ □ PK KP □ □ □ □ KiL □ □
			≥1960	□ V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP □ □ OP PeP Ks □ □
Trachys				
minutus (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	□ A V U EK St EH ES LK □ □ PH PS PK KP □ □ OP □ □ □ □ □ □
			≥1960	□ A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn □ □ □ □ □ □
Habroloma				
nanum (Paykull, 1799)	LC	30	<1960	□ A V U □ □ St EH ES LK □ □ PH □ □ PK □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
			≥1960	□ A V U EK St EH ES □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Byrrhidae				
Simplocaria				
semistriata (Fabricius, 1794)	LC	2	<1960	□ A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP □ □ OP PeP Ks KiL □ □
			≥1960	□ A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks □ Sol □ InL
metallica (Sturm, 1807)	LC	60	<1960	□ V □
			≥1960	□ V □
Morychus				
aeneus (Fabricius, 1775)	LC	10	<1960	□ V U □ □ St EH ES □ □ □ □ KP □ □ OP □ □ □ □ □ □
			≥1960	□ U EK □ □ EH ES LK □ □ PH □ □ PK KP Kn OP □ Ks
Arctobyrrhus				
dovrensis Münster, 1902	NT	80	<1960	□ □
			≥1960	□ □
Cytillus				
sericeus (Forster, 1771)	LC	1	<1960	□ A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP □ □ OP PeP Ks KiL Sol □ InL
			≥1960	□ A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
auricomus (Duftschmid, 1825)	LC	2	<1960	□ A V U □ □ St EH ES □ □ EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol □ InL
			≥1960	□ A V U EK □ □ EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
Byrrhus				
fasciatus (Forster, 1771)	LC	1	<1960	□ A V U □ □ St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
			≥1960	□ A V U EK St EH ES LK □ □ PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL

<i>arietus Steffahny, 1843</i>	LC	2	<1960	A V U St EH LK EP PH PK Kn PeP Ks Kil Sol InL
<i>pustulatus (Forster, 1771)</i>	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
<i>pilula (Linnaeus, 1758)</i>	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES LK PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol InL
Porcinolus				
<i>murinus (Fabricius, 1794)</i>	LC	60	<1960	V EH Kn Ks
			≥1960	U St EH ES EP PH PK
Chaetophora				
<i>spinosa (Rossi, 1794)</i>	LC	60	<1960	LK
			≥1960	U EK EH ES PH
Curimopsis				
<i>paleata (Erichson, 1846)</i>	LC	6	<1960	V U EH ES PH PK
			≥1960	V U EK St EH ES LK PH PK KP PeP Ks
<i>setigera (Illiger, 1798)</i>	LC	80	<1960	V U St EH ES LK KP OP
			≥1960	U St EH PH PS
<i>cyclolepidia (Münster, 1902)</i>	LC	80	<1960	EnL InL
			≥1960	KP EnL InL
Elmidae				
Stenelmis				
<i>canaliculata (Gyllenhal, 1808)</i>	LC	40	<1960	
			≥1960	V U EH ES PH PK
Elmis				
<i>aenea (Müller, 1806)</i>	LC	4	<1960	A V U EH ES LK PH PS PK KP OP PeP Ks Kil EnL InL
			≥1960	V U St EH LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks Kil Sol EnL InL
Oulimnius				
<i>tuberculatus (Müller, 1806)</i>	LC	10	<1960	V U St EH ES PH PK KP Ks Kil InL
			≥1960	V U EK St EH EP PH PS PK KP OP PeP Ks Sol EnL InL
Limnius				
<i>volckmari (Panzer, 1793)</i>	LC	10	<1960	U EH ES PeP Ks
			≥1960	V U St EH PH PS PK OP Ks Kil InL
Normandia				
<i>nitens (Müller, 1817)</i>	LC	60	<1960	EH ES PeP Ks
			≥1960	EH ES PK PeP Ks
Dryopidae				
Dryops				
<i>auriculatus (Geoffroy, 1785)</i>	LC	60	<1960	A V U EH LK KP Kn OP
			≥1960	A V U EH
<i>anglicanus Edwards, 1909</i>	LC	60	<1960	A Kn
			≥1960	A EK EH PK PeP
<i>griseus (Erichson, 1847)</i>	LC	40	<1960	A V EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP
			≥1960	A V EP PH PK KP OP Ks
<i>similaris Bollow, 1936</i>	LC	30	<1960	A V PH KP OP
			≥1960	A V U PH KP OP
<i>ernesti Des Gozis, 1886</i>	LC	20	<1960	A V U St EP OP PeP Ks
			≥1960	A V U EK St OP PeP Ks
<i>luridus (Erichson, 1847)</i>	NA	100	<1960	
			≥1960	A
Limnichidae				
Limnichus				
<i>sericeus (Duftschmid, 1825)</i>	NE	100*	<1960	
			≥1960	U PK

Heteroceridae

Heterocerus

<i>flexuosus</i> Stephens, 1829	EN	100	<1960	A	U	St				KP				
			≥1960	A	V	U	EK				KP			
<i>obsoletus</i> Curtis, 1828	NT	100	<1960	A										
			≥1960	A	V									
<i>marginatus</i> (Fabricius, 1787)	LC	30	<1960		V	U	St	EH	ES					
			≥1960		V	U	St	EH	LK					
<i>fenestratus</i> (Thunberg, 1784)	LC	30	<1960	A	V	U	St	EH			PK			
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	LK				
<i>fusculus</i> Kiesenwetter, 1843	LC	10	<1960	A	V	U	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	PH	PK	Kn

Augyles

hispidulus (Kiesenwetter, 1843)	NT	80	<1960			ES			PK	KP			
			≥1960		U					KP	OP		
intermedius (Kiesenwetter, 1843)	LC	40	<1960	A	U	EH	LK			OP			
			≥1960	A	U	EK	St	EH	ES	PH	PS	KP	OP

Psephenidae

Eubria

palustris (Germar, 1818)	VU	100*	<1960		>1960	
			≥1960			PK

Eucnemidae

Melasis

Hylochares

Xylophilus

corticalis (Paykull, 1800)	EN	100	<1960																					
			≥1960			EH																		

Hylis


<i>procerulus</i> (Mannerheim, 1823)	LC	10	<1960	V	U	St							
			≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK

carinice

Microrhagus

pygmaeus (Fabricius)

Dirrhagofarsus *Homopus* (Müller, 1847) SP 100-1066

Eucnemis capucina Ahrens, 1812	NT	20	<1960		PS	
---	-----------	-----------	-------	--	----	---

Throscidae**Aulonothroscus**

<i>laticollis</i> (Rybicki, 1897)	CR	100	<1960														PS					
			≥1960														ES					
<i>brevicollis</i> (Bonvouloir, 1859)	NE	100	<1960																			
			≥1960														ES					

Trixagus

<i>dermestoides</i> (Linnaeus, 1767)	LC	6	<1960	A	V	U	St	EH														
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK						PK					EnL
<i>carinifrons</i> (Bonvouloir, 1859)	LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK	KP							
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP			EnL
<i>leseigneuri</i> Muona, 2002	NE	100	<1960				U															
			≥1960				V															
<i>meybohmi</i> Leseigneur, 2005		60	<1960																			
			≥1960	A	V	U	EK		EH	ES												
<i>exul</i> (Bonvouloir, 1859)	EN	100	<1960				V															
			≥1960				V															
<i>atticus</i> Reitter, 1921	VU	100	<1960															KP				
			≥1960					EK													Ks	

Elateridae**Drapetes**

<i>mordelloides</i> (Host, 1789)	EN	100	<1960		V																	
			≥1960			EK		ES		PH		PK										

Agrypnus

<i>murinus</i> (Linnaeus, 1758)	VU	60	<1960	A	V	U	EK	EH	ES	LK	PH						OP					
			≥1960		V	U			ES	LK			PK									

Lacon

<i>lepidopterus</i> (Panzer, 1800)	VU	100	<1960																			
			≥1960																		Ks	

Danosoma (Lacon (part.))

<i>conspersum</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	6	<1960		V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL		
			≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL
<i>fasciatum</i> (Linnaeus, 1758)	LC	15	<1960	A	V	U	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL		
			≥1960						EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			

Drilus

<i>concolor</i> Ahrens, 1812	VU	100	<1960	A																		
			≥1960	A																		

Hypnoidus

<i>riparius</i> (Fabricius, 1792)	LC	4	<1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	
			≥1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL
<i>rivularius</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	10	<1960			U		St									Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	
			≥1960		A					EP							OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	

Berninelsonius (Ascoliocerus)

<i>hyperboreus</i> (Gyllenhal, 1827)	NT	80	<1960																	KiL	EnL	InL
			≥1960																	KiL	EnL	

Hemicrepidius

<i>niger</i> (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960		V	U	St	EH									KP					
			≥1960		A	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS			OP					

Crepidophorus

<i>mutilatus</i> (Rosenhauer, 1847)	EN	80	<1960		V																	
			≥1960		V	U	EK															

Athous

<i>haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)	LC	30	<1960	A	V						PH						OP						
			≥1960	A	V																		
<i>subfuscus</i> (Müller, 1764)	LC	1	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	
			≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL

Pheletes		
<i>aeneoniger</i> (DeGeer, 1774)	LC	2 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Diacanthous		
<i>undulatus</i> (DeGeer, 1774)	LC	4 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL ≥1960 A V U EK EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Denticollis		
<i>linearis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	1 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>borealis</i> (Paykull, 1800)	LC	15 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL ≥1960 A V U EH ES LK PH PS PK Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Cidnopus		
<i>aeruginosus</i> (Olivier, 1790)	LC	10 <1960 A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks ≥1960 A V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP Ks
Limonius		
<i>minutus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	30 <1960 A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks ≥1960 A V St EH ES LK
Ctenicera		
<i>pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP
<i>cuprea</i> (Fabricius, 1775)	LC	10 <1960 A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks ≥1960 A V U St EH ES LK PS PK KP Kn OP PeP Ks
Liotrichus		
<i>affinis</i> (Paykull, 1800)	LC	4 <1960 A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Orithales		
<i>serraticornis</i> (Paykull, 1800)	LC	2 <1960 A V U St EH LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Actenicerus		
<i>sjællandicus</i> (Müller, 1764)	LC	2 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
Prosternon		
<i>tessellatum</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Anostirus		
<i>castaneus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6 <1960 A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP OP ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks Sol
Pseudanostirus		
<i>globicollis</i> (Germar, 1843)	VU	80 <1960 A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks ≥1960 A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
Aplotarsus		
<i>incanus</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	2 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
Paraphotistus (Selatosomus (part.))		
<i>impressus</i> (Fabricius, 1792)	LC	2 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>nigricornis</i> (Panzer, 1799)	NT	60 <1960 A V U St EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks ≥1960 A V U EK EH
Selatosomus		
<i>cruciatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6 <1960 A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks
<i>melancholicus</i> (Fabricius, 1798)	LC	2 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>aeneus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2 <1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL ≥1960 A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Eanus*costalis* (Paykull, 1800)

LC	2	<1960	St EH LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Negastrius*pulchellus* (Linnaeus, 1761)

LC	40	<1960	U St KP OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A U St KP OP PeP Ks KiL SoL InL

arenicola (Boheman, 1854)

NE	15	<1960	U KP OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	U PeP InL

Zorochros*minimus* (Lacordaire, 1835)

LC	10	<1960	A V U St EP KP OP PeP Ks SoL InL
		≥1960	A V U EK St EP PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL

Fleutiauxellus*maritimus* (Curtis, 1840)

NT	80	<1960	KiL
		≥1960	EnL InL

aligidus (J.Sahlberg, 1883)

NT	100	<1960	PeP Ks KiL InL
		≥1960	Ks InL

Neohypdonus*arcticus* Candèze, 1860

LC	40	<1960	Ks KiL InL
		≥1960	St Ks KiL SoL EnL InL

Ampedus*cinnabarinus* (Eschscholtz, 1829)

EN	100	<1960	A V U St EH ES KP
		≥1960	EK EH ES KP

sanguineus (Linnaeus, 1758)

EN	100	<1960	V U EH ES EP KP
		≥1960	U St ES PK

pomonae (Stephens, 1830)

LC	4	<1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol

sanguinolentus (Schrank, 1776)

LC	30	<1960	A V U EK St EH PK
		≥1960	A V U EK St EH

nigroflavus (Goeze, 1777)

LC	15	<1960	A V U PH PS
		≥1960	A V U EK St EH ES PH PS PK

pomorum (Herbst, 1784)

LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks

suecicus Palm, 1976

LC	40	<1960	V St EH EP PH
		≥1960	EH ES PH PS PK Kn PeP Ks

balteatus (Linnaeus, 1758)

LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL

lepidus (Mäklin, 1876)

VU	80	<1960	Kn
		≥1960	PK Kn PeP

praeustus (Fabricius, 1792)

VU	60	<1960	A V U St EH ES PH PS PK
		≥1960	V U EH ES EP

tristis (Linnaeus, 1758)

LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL

erythrogonus (Müller, 1821)

LC	6	<1960	V U St EH ES LK PH PS PK KP
		≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Ks

nigrinus (Herbst, 1784)

LC	1	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Sericus*brunneus* (Linnaeus, 1758)

LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Agriotes*ustulatus* (Schaller, 1783)

NE	100*	<1960	ES
		≥1960	

lineatus (Linnaeus, 1767)

LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PS OP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PS PK KP OP

obscurus (Linnaeus, 1758)

LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL

Ectinus*atterimus* (Linnaeus, 1761)

LC	30	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK

Dalopius*marginatus* (Linnaeus, 1758)

LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK

Adrastus*pallens* (Fabricius, 1792)

LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A V U EK EH ES LK PH PS PK Kn

Melanotus*villosus* (Geoffroy, 1785)

LC	40	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A V U EK EH ES

castanipes (Paykull, 1800)

LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks

Cardiophorus*ruficollis* (Linnaeus, 1758)

LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP

ebeninus (Germar, 1824)*vestigialis* Erichson, 1840*asellus* Erichson, 1840

LC	30	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A V U EH ES LK PS PK
VU	80	<1960	A V U EH
		≥1960	A V U EH ES PK

Lycidae**Dictyoptera***aurora* (Herbst, 1784)

LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Pyropterus*nigroruber* (DeGeer, 1774)

LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn

Platycis*minuta* (Fabricius, 1787)

LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP KiL

Lopheros*rubens* (Gyllenhal, 1817)

VU	100	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	A V U ES PS

Lygistopterus*sanguineus* (Linnaeus, 1758)

LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Lampyridae**Lampyris***noctiluca* (Linnaeus, 1758)

LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks

Phosphaenus*hemipterus* (Goeze, 1777)

LC	15	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	A V U EK EH

Cantharidae**Podabrus***alpinus* (Paykull, 1798)

LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

lapponicus (Gyllenhal, 1810)

LC	10	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	A V U EH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

flavimanus (Motschulsky, 1860)

LC	30	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL
		≥1960	A V U ES LK Ks EnL InL

Ancistronycha*tigurina* (Dietrich, 1857)

RE	100*	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL InL
		≥1960	A V U EP PS PK KP Kn

Cantharis

<i>fusca</i> Linnaeus, 1758	LC	6 <1960	A V U St EH ES LK PH Kn
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH Kn OP
<i>rustica</i> Fallén, 1807	LC	20 <1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP
		≥1960	A V U St EH ES LK PK
<i>obscura</i> Linnaeus, 1758	LC	4 <1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP InL
		≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP InL
<i>pulicaria</i> Fabricius, 1781	NE	100 <1960	
		≥1960	U
<i>nigricans</i> (Müller, 1776)	LC	4 <1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK
<i>pellucida</i> Fabricius, 1792	LC	4 <1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn
<i>livida</i> Linnaeus, 1758	LC	6 <1960	V U EH ES LK PS
		≥1960	A V U EK St EH ES LK PH KP OP PeP
<i>figurata</i> Mannerheim, 1843	LC	2 <1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
<i>quadripunctata</i> (Müller, 1776)	LC	20 <1960	A V U EK St EP PH PS PK KP OP PeP
		≥1960	A V U EK St ES KP OP PeP
<i>rufa</i> Linnaeus, 1758	LC	4 <1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL
		≥1960	A V U EK EH ES PH PS PK KP OP Ks
<i>flavilabris</i> Fallén, 1807	LC	4 <1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK
<i>nigra</i> (DeGeer, 1774)	LC	40 <1960	U LK
		≥1960	V U EK St EH ES LK
<i>paludosa</i> Fallén, 1807	LC	2 <1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks SoL
		≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>lateralis</i> Linnaeus, 1758	LC	10 <1960	
		≥1960	A V U EK St EH ES LK

Rhagonycha

<i>fulva</i> (Scopoli, 1763)	NA	100* <1960	
		≥1960	V U ES
<i>testacea</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2 <1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>nigriventris</i> Motschulsky, 1860	LC	1 <1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>lignosa</i> (Müller, 1764)	LC	6 <1960	A V U EH ES LK PH PS
		≥1960	A V U EK EH ES LK PH PS PK OP
<i>elongata</i> (Fallén, 1807)	LC	1 <1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>atra</i> (Linnaeus, 1767)	LC	2 <1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>fugax</i> Mannerheim, 1843	NT	60 <1960	A V U EH ES LK PS PK
		≥1960	EK ES LK PK

Podistra

<i>rufotestacea</i> (Letzner, 1845)	LC	4 <1960	A V U St EH ES LK PH PS PK PeP KiL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL
<i>schoenherri</i> (Dejean, 1837)	LC	1 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL

Silis

<i>ruficollis</i> (Fabricius, 1775)	LC	30 <1960	A
		≥1960	A V U St EH OP

Malthinus

<i>biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4 <1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
<i>flaveolus</i> (Herbst, 1786)	LC	6 <1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn

<i>raptor</i> Sturm, 1837	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL
			≥1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn Ks
<i>Dryophilus</i>	LC	40	<1960	A V U
<i>pusillus</i> (Gyllenhal, 1808)			≥1960	A V U
<i>Xestobium</i>	NT	80	<1960	A
<i>rufovillosum</i> (DeGeer, 1774)			≥1960	A
<i>Episernus</i>	LC	10	<1960	U EK EH LK PH PK Kn OP PeP Ks KiL EnL
<i>angulicollis</i> Thomson, 1863			≥1960	V U EK EH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
<i>Ernobia</i>	LC	15	<1960	A V U EH ES LK PH
<i>longicornis</i> (Sturm, 1837)			≥1960	A V U EK St EH PH PS PK Kil EnL InL
<i>nigrinus</i> (Sturm, 1837)	LC	10	<1960	A V U EH ES LK EP PK
			≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PK Kn OP PeP Ks Kil Sol InL
<i>explanatus</i> (Mannerheim, 1843)	LC	4	<1960	V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol InL
<i>mollis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	15	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH KP Kn OP PeP
<i>angusticollis</i> (Ratzeburg, 1837)	VU	80	<1960	A V U
			≥1960	A V U EH
<i>abietinus</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	60	<1960	A V
			≥1960	A V U EK
<i>abietis</i> (Fabricius, 1792)	LC	10	<1960	A V U EK St EH ES PH
			≥1960	A V U EK St EH ES PH PS KP
<i>pini</i> (Sturm, 1837)	VU	100	<1960	
			≥1960	A
<i>Stegobium</i>	NA	15	<1960	A V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn OP Kil EnL
<i>paniceum</i> (Linnaeus, 1758)			≥1960	V U EK St EH ES i OP
<i>Anobium</i>	LC	20	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP
<i>punctatum</i> (DeGeer, 1774)			≥1960	A V U EK St EH ES EP KP OP
<i>canaliculatum</i> (Thomson, 1863)	LC	40	<1960	A V U
			≥1960	A V U EK
<i>fulvicorne</i> Sturm, 1837	EN	100	<1960	V
			≥1960	V
<i>rufipes</i> Fabricius, 1792	LC	6	<1960	A V U St EH ES PH PS PK KP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP
<i>thomsoni</i> (Kraatz, 1881)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
<i>Microbregma</i>	LC	10	<1960	A V U EH EP PH PS PK KP Kn PeP
<i>emarginata</i> (Dufschmid, 1825)			≥1960	A V U St EH ES PH PS PK KP Kn PeP Ks
<i>Hadrobregmus</i>	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil
<i>pertinax</i> (Linnaeus, 1758)			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol
<i>confusus</i> (Kraatz, 1881)	LC	4	<1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Sol
<i>Priobium</i>	NT	80	<1960	U EK ES LK PS PK KP
<i>carpini</i> (Herbst, 1793)			≥1960	U EK EH ES PH PK
<i>Ptilinus</i>	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK KP
<i>fuscus</i> Geoffroy, 1785			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP

Calitys*scabra* (Thunberg, 1784)

LC	10	<1960	V U St EH PH Kn
		≥1960	V U EK St EH ES PH PK Kn Ks EnL

Nemozoma*elongatum* (Linnaeus, 1761)

LC	30	<1960	A V U St EH PS
		≥1960	A V U EK St EH

Tenebroides*mauritanicus* (Linnaeus, 1758)

NA	100*	<1960	V U EH ES PS KiL
		≥1960	U

Cleridae**Tillus***elongatus* (Linnaeus, 1758)

LC	30	<1960	A V U St EH PS
		≥1960	A V U EK EH ES PS

Opilo*domesticus* (Sturm, 1837)

i	<1960	i
	≥1960	i

Thanasimus*formicarius* (Linnaeus, 1758)

LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL EnL

femoralis (Zetterstedt, 1828)

LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL

Tarsostenus*univittatus* (Rossi, 1792)

i	<1960	
	≥1960	i i

Korynetes*caeruleus* (DeGeer, 1775)

NA	100*	<1960	V ES
		≥1960	

Necrobia*ruficollis* (Fabricius, 1775)

NA	100	<1960	V
		≥1960	U EH PK

violacea (Linnaeus, 1758)

LC	4	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP OP Ks KiL EnL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK Kn OP PeP Ks KiL EnL InL

rufipes (DeGeer, 1775)

LC	60	<1960	V U EK EH
		≥1960	V U EK St ES PS PK OP

Rhadalidae**Aplocnemus***impressus* (Marsham, 1802)

LC	60	<1960	U
		≥1960	V EK EH ES PS KP

nigricornis (Fabricius, 1792)

LC	6	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PeP
		≥1960	A V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn OP

tarsalis (Sahlberg, 1822)

LC	10	<1960	U St EH ES EP PH
		≥1960	V U EK St EH ES PS PK OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

Semijulistus*callosus* (Solsky, 1868)

NA	100	<1960	
		≥1960	KP OP

Dasytidae**Dasytes***niger* (Linnaeus, 1761)

LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks

obscurus Gyllenhal, 1813

LC	2	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

cyaneus (Fabricius, 1775)

LC	40	<1960	A
		≥1960	A V

fusculus (Illiger, 1801)

NT	60	<1960	U EK ES LK
		≥1960	U EK ES KP Ks

<i>linariae</i> (Stephens, 1830)	LC	6 <1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK											
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP											
Nitidulidae														
Carpophilus		i <1960	i i i											
<i>ligneus</i> Murray, 1864		≥1960					i							
<i>dimidiatus</i> (Fabricius, 1792)		i <1960	i i i											
		≥1960	i											
<i>marginellus</i> Motschulsky, 1858	LC	6 <1960												
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn											
<i>hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	40 <1960	V U EH											
		≥1960	V U EK EH	PH		KP								
Epuraea														
<i>melanocephala</i> (Marsham, 1802)	NA	100 <1960												
		≥1960	A											
<i>guttata</i> (Olivier, 1811)	NT	100 <1960	V											
		≥1960	V											
<i>hilleri</i> Reitter, 1877	LC	30 <1960	EH ES	PH	PK									
		≥1960	U EK EH ES	PH PS PK	Kn	PeP Ks								
<i>neglecta</i> (Heer, 1841)	LC	10 <1960	U EH ES LK	PH PS PK										
		≥1960	V U EK EH ES LK	PH PS PK	Kn	OP								
<i>pallescens</i> (Stephens, 1832)	LC	2 <1960	A V U St EH ES LK	PH PS PK	KP	Kn	OP PeP	KiL	SoL	InL				
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn	OP PeP Ks	KiL	SoL	EnL							
<i>laeviuscula</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	4 <1960	A V U EH	PH PS PK			PeP	KiL						
		≥1960	V U EK St EH ES	PH PS PK	KP	Kn	OP PeP Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
<i>rufobrunnea</i> Sjöberg, 1939	LC	30 <1960	EH											
		≥1960	V U EK EH ES	PH PS PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>deubeli</i> Reitter, 1898	LC	10 <1960	V U EH											
		≥1960	V U St EH ES	PH	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	Sol			
<i>thoracica</i> Tournier, 1872	LC	4 <1960	A V U St EH	LK EP PH	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL			
		≥1960	A V U EK St EH ES	PH	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	
<i>angustula</i> Sturm, 1844	LC	2 <1960	V U EH	PH PS PK		Kn	PeP	KiL	EnL					
		≥1960	A V U EK St EH ES LK	PH PS PK	KP	Kn	OP PeP Ks	KiL	SoL	EnL	InL			
<i>oblonga</i> (Herbst, 1793)	LC	4 <1960	A V U St EH ES	EP	PS	PK	KP	OP	PeP					
		≥1960	A V U EK St EH ES	EP PH PS PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>longipennis</i> Sjöberg, 1939	LC	40 <1960												
		≥1960	EH	PS	PK	Kn			Ks					
<i>fussii</i> Reitter, 1875	LC	15 <1960	V U EH LK	PS	PK	Kn	OP	PeP	Ks	KiL				
		≥1960	V U St EH ES	PH PS PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	Sol				
<i>boreella</i> (Zetterstedt, 1828)	LC	1 <1960	V U EK St EH ES	PH PS PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
		≥1960	A V U EK St EH ES	PH PS PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>opalizans</i> J.Sahlberg, 1889	LC	4 <1960	A V U St EH ES	EP PH	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
		≥1960	A V U EK St EH LK EP PH	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
<i>marseuli</i> Reitter, 1873	LC	2 <1960	A V U EK St EH ES LK	PH PS PK	KP	Kn	PeP	Ks	KiL					
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH	PS	PK	Kn	PeP	Ks	KiL					
<i>pygmaea</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	2 <1960	V U St EH ES LK EP PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>longula</i> Erichson, 1845	NT	100 <1960	V											
		≥1960	U											
<i>binotata</i> Reitter, 1873	LC	2 <1960	A V U EH ES LK EP PH	PS	PK	KP		PeP						
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>placida</i> Mäklin, 1853	LC	4 <1960	V U EH ES LK EP PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
		≥1960	A V U St EH ES LK EP PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>terminalis</i> (Mannerheim, 1843)	LC	2 <1960	A V U St EH ES LK	PH PS PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL			
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL
<i>longiclavis</i> Sjöberg, 1939	LC	40 <1960	V U EH											
		≥1960	A U EK St EH ES LK	PS	PK		OP							

<i>cibratus</i> Gyllenhal, 1827	LC	4	<1960	V U St EH ES LK PH PS PK PeP
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL
<i>puncticollis</i> Sahlberg, 1837	RE	100*	<1960	St
			≥1960	
Monotoma				
<i>conicicollis</i> Chevrolat, 1837	LC	4	<1960	A V U St EH ES PH PS KP OP KiL SoL
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks Sol
<i>angusticollis</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	6	<1960	A V U St EH ES PH PS KP
			≥1960	V U EK EH ES PH PS PK OP PeP KiL
<i>spinicollis</i> Aubé, 1837	NT	80	<1960	V U EH PH PK Ks
			≥1960	V U EH PH PK
<i>picipes</i> Herbst, 1793	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP OP PeP KiL SoL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol InL
<i>brevicollis</i> Aubé, 1837	LC	40	<1960	A V U EH PH PK KP OP PeP
			≥1960	U EK St EH ES LK EP PH PK Ks
<i>bicolor</i> Villa, 1835	LC	30	<1960	V U EH LK PH PS PK
			≥1960	V U EK EH LK EP PH PK
<i>quadricollis</i> Aubé, 1837	LC	40	<1960	U EH ES PH
			≥1960	A V U EK EH EP PH PK Ks
<i>testacea</i> Motschulsky, 1845	NT	100	<1960	V U
			≥1960	U EK EH
<i>longicollis</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	4	<1960	A V U St EH ES LK PH PK KP
			≥1960	A V U EK EH ES LK EP PH PK OP Ks KiL
Silvanidae				
Uleiota				
<i>planata</i> (Linnaeus, 1761)	RE	100	<1960	V U
			≥1960	U ES
Dendrophagus				
<i>crenatus</i> (Paykull, 1799)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol InL
Cryptamorpha				
<i>desjardinsi</i> Guérin-Ménéville, 1844	i	<1960		
		≥1960	i i	
Psammoecus				
<i>bipunctatus</i> (Fabricius, 1792)	LC	40	<1960	
			≥1960	A U EK St ES LK PK
Airaphilus				
<i>elongatus</i> (Gyllenhal, 1813)	LC	40	<1960	A V U St
			≥1960	A V U EK St
<i>perangustus</i> Lindberg, 1943	VU	100	<1960	A V St
			≥1960	A U St EH
Ahasverus				
<i>advena</i> (Waltl, 1834)	LC	10	<1960	U KP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP
Oryzaephilus				
<i>surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	15	<1960	V U EH EP PH
			≥1960	A V U EH PH KP Kn
<i>mercator</i> (Fauvel, 1889)	NA	20	<1960	V U EH EP KP
			≥1960	U EH EP PK
Silvanus				
<i>bidentatus</i> (Fabricius, 1792)	LC	20	<1960	V U EK EH ES LK PH PS KP
			≥1960	V U EK EH ES LK PH PS PK KP Kn OP Ks
<i>unidentatus</i> (Olivier, 1790)	EN	80	<1960	V U EH ES PS PK
			≥1960	U EK EH ES PS PK KP

Stethorus*pusillus* (Herbst, 1797)

LC	30	<1960	V U	St EH ES LK																		
		≥1960	V U EK	St EH ES LK																		

Scymnus*nigrinus* Kugelann, 1794

LC	2	<1960	A V U EK	St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP	KiL																	
		≥1960	A V U EK	St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP	Ks																	

suffrianooides J.Sahlberg, 1913

DD	100*	<1960	V																			
		≥1960																				

frontalis (Fabricius, 1787)

LC	15	<1960	A V U	St EH ES LK EP PH	PK KP Kn OP																	
		≥1960	V U EK	St EH ES LK	PK	Kn OP	PeP															

schmidti Fürsch, 1958

LC	30	<1960	A V U	St EH ES																		
		≥1960	A V U EK	St ES LK																		

jakowlewi Weise, 1892

DD	80	<1960	V	EK																		
		≥1960	V U EK	St	PH	PK	Kn	OP	Ks	KiL	InL											

rubromaculatus (Goeze, 1777)

VU	100	<1960	V U																			
		≥1960	V U EK		LK																	

femoralis (Gyllenhal, 1827)

LC	40	<1960	V U	St EH ES	EP	PS																
		≥1960	V U EK	St EH ES LK			OP															

abietis (Paykull, 1798)

LC	40	<1960	A V U	EK	EH ES																	
		≥1960	A V U EK																			

ferrugatus (Moll, 1785)

LC	40	<1960	V U	St EH ES LK																		
		≥1960	V U EK	EH ES																		

auritus Thunberg, 1795

LC	40	<1960	A V U	EH		PS																
		≥1960	A V U																			

suturalis Thunberg, 1795

LC	4	<1960	A V U EK	St EH ES LK EP PH	PS PK KP Kn OP	PeP	Ks	KiL														
		≥1960	A V U EK	St EH ES LK EP PH	PS PK KP Kn OP	PeP	Ks	SOL	InL													

haemorrhoidalis Herbst, 1797

LC	2	<1960	A V U	St EH ES LK EP PH	PS PK KP Kn OP	PeP	Ks	KiL														
		≥1960	A V U EK	St EH ES LK EP PH	PS PK KP Kn OP	PeP	Ks	SOL	InL													

limbatus Stephens, 1832

LC	40	<1960	V U	St EH ES LK EP PH	PS PK KP	OP	PeP	KiL	EnL													
		≥1960	V U EK	St EH ES LK EP PH	PS	Kn	PeP	KiL	EnL													

fennicus J.Sahlberg, 1886

LC	40	<1960	V U	EH	EP PH	PK KP	OP	PeP	KiL	SOL	EnL	InL										
		≥1960	A V U	St EH ES LK	PS	PK	Kn	PeP	KiL	SOL	EnL	InL										

Nephus*redtenbacheri* (Mulsant, 1846)

LC	4	<1960	A V U EK	St EH ES LK EP PH	PS PK KP Kn OP	PeP	Ks	KiL	SOL	EnL	InL											
		≥1960	A V U EK	St EH ES LK EP PH	PS PK KP Kn OP	PeP	Ks	SOL														

limonii (Donisthorpe, 1903)

NA	80	<1960	A U																			
		≥1960	A V U		EP																	

jacobsoni (Barovskij, 1906)

NA	100	<1960																				
		≥1960			EH																	

bipunctatus (Kugelann, 1794)

LC	30	<1960	V U EK	St EH ES LK	PS	Kn																
		≥1960	V U EK	St EH ES LK	PS	Kn																

bisignatus (Boheman, 1850)

LC	6	<1960	A V U	EH ES LK	PS PK	Kn	OP															
		≥1960	A V U EK	St EH ES LK	PS PK	Kn	OP															

Hyperaspis*concolor* (Suffrian, 1843)
VU	80	<1960	V U EK																			

<tbl_r cells="23" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols

Coccinella

<i>undecimpunctata</i> Linnaeus, 1758	LC	15	<1960	A V U St EH EP PK KP OP PeP Ks KiL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH EP PH PS PK KP OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>trifasciata</i> Linnaeus, 1758	LC	4	<1960	V U St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
			≥1960	V St EH EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>septempunctata</i> Linnaeus, 1758	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>magnifica</i> Redtenbacher, 1843	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP
<i>hieroglyphica</i> Linnaeus, 1758	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
<i>quinquepunctata</i> Linnaeus, 1758	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL

Oenopia

<i>conglobata</i> Linnaeus, 1758	LC	40	<1960	A V U EH ES PH PS
			≥1960	V U EK EH ES LK PH

Adalia

<i>conglomerata</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS KP OP PeP Ks KiL
<i>bipunctata</i> ssp. <i>bipunctata</i> (L., 1758)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP EnL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP KiL EnL InL
<i>bipunctata</i> ssp. <i>frigida</i> (Schn., 1792)	LC	40	<1960	U Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	KP KiL EnL InL
<i>decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	LC	20	<1960	A V U EK St EH EP PK
			≥1960	A V U EK EH ES

Harmonia

<i>quadripunctata</i> (Pontopp., 1763)	NA	100a	<1960	
			≥1960	U
<i>axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	100a	<1960	PH
			≥1960	A V

Subcoccinella

<i>vigintiquatuorpunctata</i> (L., 1758)	LC	30	<1960	A V U St EH ES LK EP PK KP
			≥1960	A V EK St EH ES LK EP PK

Cynegetis

<i>impunctata</i> (Linnaeus, 1767)	LC	40	<1960	A V St
			≥1960	A V

Corylophidae**Orthoperus**

<i>brunnipes</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	2	<1960	A V U St EH ES PH PS PK KP
			≥1960	A V U EK St EH EP PH PS PK KP OP PeP Ks
<i>punctatus</i> Wankowicz, 1865	LC	4	<1960	V U EH
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PS PK KP Kn PeP Ks
<i>rogeri</i> Kraatz, 1874	LC	4	<1960	V U St EH ES PH PS PK KP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol
<i>atomus</i> (Gyllenhal, 1808)	LC	4	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP Kn PeP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn OP PeP Ks Sol
<i>corticalis</i> (Redtenbacher, 1845)	LC	4	<1960	A V U EH ES LK PH PS PK KP
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP

Clypastraea

<i>pusilla</i> (Gyllenhal, 1810)	LC	40	<1960	V EH PS KP
			≥1960	V St EH ES PK Kn OP Ks Sol

Arthrolips

<i>obscura</i> (Sahlberg, 1833)	RE	100*	<1960	V St PS
			≥1960	

Sericoderus*lateralis* (Gyllenhal, 1827)

LC	20	<1960	V U																						
		≥1960	A V U EK	EH	ES	LK	EP	PH		PK															

Corylophus*cassidoides* (Marsham, 1802)

NA	100*	<1960	U																						
		≥1960																							

Latridiidae**Latridius***hirtus* Gyllenhal, 1827

LC	2	<1960	A V U	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK		Kn	PeP	KiL										
		≥1960	A V U EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL					

consimilis Mannerheim, 1844

LC	1	<1960	A V U		EH	ES	LK	PH	PK	KP		OP	PeP	KiL		EnL	InL							
		≥1960	V U EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL				

porcatus Herbst, 1793

LC	6	<1960	A V		EH		EP			KP														KiL
		≥1960	A V U EK	St	EH	ES	LK	PH	PS	PK		OP												InL

minutus (Linnaeus, 1767)

LC	2	<1960	A V U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL				
		≥1960	A V U EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL			

assimilis Mannerheim, 1844

NE	100	<1960	U		EH																			
		≥1960	U																					Ks

gemellatus Mannerheim, 1844

LC	6	<1960	A V U		EH	ES																		
		≥1960	A V U EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL						

brevicollis (Thomson, 1868)

NT	60	<1960			EH																			
		≥1960	V U EK		EH	ES																		

Enicmus*lundbladi* Palm, 1956

LC	60	<1960				LK																		
		≥1960	A V U EK		EH	ES	EP		PS															

fungicola Thomson, 1868

LC	1	<1960	A V U		EH																			KiL	InL
		≥1960	A V U EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	EnL	InL					

planipennis Strand, 1940

LC	2	<1960		U					PS															
		≥1960	A V U EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL							

apicalis J.Sahlberg, 1926

LC	20	<1960																							Sol
		≥1960																							InL

rugosus (Herbst, 1793)

LC	2	<1960	A V U	St	EH	ES	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	KiL		EnL								
		≥1960	A V U EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	SoL	InL					

testaceus (Stephens, 1830)

NA	80	<1960																							
		≥1960	A																						

transversus (Olivier, 1790)

LC	4	<1960	A V U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	OP	PeP										
		≥1960	A V U EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP									

histrio Joy & Tomlin, 1910

LC	30	<1960	A V U	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	OP	PeP	Ks	KiL								
		≥1960	A V U EK	St	EH	ES																		

*Dienerella**vincenti* Johnson, 2007

LC	40	<1960	A V U																					
		≥1960	A V U		St	EH			PH															

clathrata (Mannerheim, 1844)

NT	60	<1960	V																					
		≥1960	V U																					

ruficollis (Marsham, 1802)

Stephostethus

<i>lardarius</i> (DeGeer, 1775)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL		InL
<i>attenuatus</i> (Mannerheim, 1844)	VU	100*	<1960			
			≥1960			Sol
<i>angusticollis</i> (Gyllenhal, 1827)	NT	80	<1960		LK	
			≥1960	V	LK	
<i>pandellei</i> (Bris. de Barn., 1863)	LC	2	<1960	V U St EH ES LK PH PS PK	OP	
			≥1960	V U EK St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL	InL	
<i>cinnamopterus</i> (Mannerh., 1844)	NT	80	<1960			InL
			≥1960			KiL Sol EnL InL
<i>variolosus</i> (Mannerheim, 1844)	LC	6	<1960	U EH ES LK PH PS PK KP	OP PeP Ks KiL SoL EnL InL	
			≥1960	V U St EH ES LK EP PH PS PK KP	OP PeP Ks KiL Sol EnL InL	
<i>alternans</i> (Mannerheim, 1844)	LC	40	<1960	U EH		
			≥1960	A V U EK EH ES PH	PeP	
<i>rugicollis</i> (Olivier, 1790)	LC	2	<1960	A V U EH ES LK PH PK KP		InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL		

Thes

<i>bergrothi</i> (Reitter, 1881)	LC	15	<1960	A V U St EH ES EP PH PK		
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS Kn OP KiL		

Cartodere

<i>bifasciata</i> (Reitter, 1877)	NA	100	<1960			
			≥1960	U		
<i>nodifer</i> (Westwood, 1839)	LC	10	<1960	A V U		
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PK		
<i>constricta</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	6	<1960	V U St EH ES LK PH PS PK		
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Sol InL		

Corticaria

<i>pubescens</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	4	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL		
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Sol		
<i>dentiventris</i> Poppius, 1904	NT	100	<1960	U		
			≥1960			Ks KiL Sol InL
<i>pineti</i> Lohse, 1960	NT	80	<1960			
			≥1960	U EK ES	PeP Ks KiL	
<i>crenulata</i> (Gyllenhal, 1827)	NT	60	<1960			
			≥1960	A V U		
<i>fulva</i> (Comolli, 1837)	NA	100	<1960	A V U EH		
			≥1960	U		
<i>umbilicata</i> (Beck, 1817)	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP	Ks	InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks Sol EnL InL		
<i>aphictoides</i> Reitter, 1898 porochini John., 2007	NT	60	<1960	V U St EH ES	PS PK KP PeP	
			≥1960	V U EK EH EP PK		
<i>impressa</i> (Olivier, 1790)	LC	4	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks	Sol InL	
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol InL		
<i>lapponica</i> (Zetterstedt, 1838)	LC	2	<1960	A V U St EH EP PH PS PK KP	PeP Ks KiL Sol EnL InL	
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol InL		
<i>saginata</i> Mannerheim, 1844	LC	10	<1960	A V U EH ES LK	PeP Ks KiL	
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks Sol		
<i>serrata</i> (Paykull, 1798)	LC	15	<1960	A V U St EH ES EP PH PS PK KP	KiL EnL	
			≥1960	A U EK EH ES PH PS	Ks	
<i>subamurensis</i> Saluk, 1993	LC	80	<1960			
			≥1960	U EK EH ES PH PK Kn PeP	Sol	
<i>cucujiformis</i> Reitter, 1881	VU	100*	<1960			
			≥1960		PK	
<i>orbicollis</i> Mannerheim, 1853	LC	6	<1960		OP PeP Ks KiL EnL InL	
			≥1960	St EH ES PH PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL		

MycetophagidaeTriphylus*bicolor* (Fabricius, 1777)

NA	100	<1960	
		≥1960	

Litargus*connexus* (Geoffroy, 1785)

LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP Kil Sol
		≥1960	

Mycetophagus*quadripustulatus* (Linnaeus, 1761)

LC	15	<1960	
		≥1960	

ater (Reitter, 1879)

NA	100	<1960	
		≥1960	

piceus (Fabricius, 1777)

LC	2	<1960	
		≥1960	

decempunctatus Fabricius, 1801

LC	6	<1960	
		≥1960	

atomarius (Fabricius, 1787)

VU	100	<1960	
		≥1960	

quadriguttatus Müller, 1821

VU	100	<1960	
		≥1960	

multipunctatus Fabricius, 1792

LC	4	<1960	
		≥1960	

fulvicollis Fabricius, 1792

LC	10	<1960	
		≥1960	

populi Fabricius, 1798

LC	4	<1960	
		≥1960	

Typhaea*stercorea* (Linnaeus, 1758)

LC	15	<1960	
		≥1960	

haagi Reitter, 1874

NT	80	<1960	
		≥1960	

CiidaeCis*lineatocibratus* Mellié, 1848

LC	2	<1960	
		≥1960	

castaneus (Herbst, 1793)

LC	10	<1960	
		≥1960	

jacquemartii Mellié, 1848

LC	1	<1960	
		≥1960	

glabratus Mellié, 1848

LC	2	<1960	
		≥1960	

comptus Gyllenhal, 1827

LC	1	<1960	
		≥1960	

micans (Fabricius, 1792)

LC	1	<1960	
		≥1960	

submicans Abeille de Perrin, 1874

LC	30	<1960	
		≥1960	

boleti (Scopoli, 1763)

LC	1	<1960	
		≥1960	

rugulosus Mellié, 1848

NE	100*	<1960	
		≥1960	

quadridens Mellié, 1848

LC	20	<1960	
		≥1960	

punctulatus Gyllenhal, 1827

LC	2	<1960	
		≥1960	

quadridentulus Perris, 1874

NA	100*	<1960	
		≥1960	

Eustrophus*dermestoides* (Fabricius, 1792)

CR	100*	<1960	
		≥1960	

Melandryidae**Orchesia***micans* (Panzer, 1793)

LC	1	<1960	
		≥1960	

minor Walker, 1837

LC	4	<1960	
		≥1960	

fasciata (Illiger, 1798)

LC	4	<1960	
		≥1960	

undulata Kraatz, 1853

NT	60	<1960	
		≥1960	

Abdera*affinis* (Paykull, 1799)

LC	4	<1960	
		≥1960	

flexuosa (Paykull, 1799)

LC	6	<1960	
		≥1960	

triguttata (Gyllenhal, 1810)

LC	4	<1960	
		≥1960	

Dircaea*quadriguttata* (Paykull, 1798)

VU	60	<1960	
		≥1960	

Phloiotrya*rufipes* (Gyllenhal, 1810)

NT	80	<1960	
		≥1960	

Xylita*laevigata* (Hellenius, 1786)

LC	2	<1960	
		≥1960	

livida (Sahlberg, 1833)

LC	6	<1960	
		≥1960	

Serropalpus*barbatus* (Schaller, 1783)

LC	6	<1960	
		≥1960	

Hypulus*bifasciatus* (Fabricius, 1792)

NT	40	<1960	
		≥1960	

Zilora*ferruginea* (Paykull, 1798)

LC	4	<1960	
		≥1960	

elongata J.Sahlberg, 1881

NE	80	<1960	
		≥1960	

Melandrya*barbata* (Fabricius, 1787)

CR	100	<1960	
		≥1960	

dubia (Schaller, 1783)

LC	15	<1960	
		≥1960	

Phryganophilus*ruficollis* (Fabricius, 1798)

VU	80	<1960	
		≥1960	

Mordellidae**Mordellaria***aurofasciata* (Comolli, 1837)

NA	100	<1960	
		≥1960	

Cteniopus*sulphureus* (Linnaeus, 1758)

CR	100*	<1960	A																					
		≥1960	A																					

Upis*cerambooides* (Linnaeus, 1758)

NT	20	<1960		V	U	EK	St	EH		EP	PH	PS	PK	KP		PeP		KiL					
		≥1960														PK		OP	PeP	Ks	KiL	Sol	EnL

Oedemeridae**Calopus***serraticornis* (Linnaeus, 1758)

LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn	OP		KiL	Sol				
		≥1960		V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn	OP		KiL					

Nacerdes*melanura* (Linnaeus, 1758)

NT	80	<1960			U	EK																	
		≥1960		A	V	U	EK																

Ditylus*laevis* (Fabricius, 1787)

EN	100	<1960				EK			ES														
		≥1960				EK			ES							PK							

Chrysanthia*viridissima* (Linnaeus, 1758)

LC	40	<1960		V	U		St			EP						OP							
		≥1960		V	U				ES						PK								

geniculata Schmidt, 1846

LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP					
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP					

Oedemera*croceicollis* (Gyllenhal, 1827)

LC	80	<1960	A																				
		≥1960	A																				

Iurida (Marsham, 1802)

LC	40	<1960	A	V	U		St	EH	ES	EP	PH	PS	PK										
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK			PK										

subrobusta (Nakane, 1954)

LC	40	<1960																					
		≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK				PK										

virescens (Linnaeus, 1767)

LC	1	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	Sol	InL
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	Sol	InL

femorata (Scopoli, 1763)

LC	10	<1960																					
		≥1960	V	U		St	EH	ES	LK		PS	PK	KP										

Stenotrachelidae**Stenotrachelus***aeneus* (Paykull, 1799)

LC	10	<1960	A		U			EH	ES		EP	PH	PS		KP	Kn	OP	PeP		KiL	Sol	EnL
		≥1960						EH			PH		PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	Sol	InL	

Scotodes*annulatus* Eschscholtz, 1818

NT	60	<1960				EH	ES	LK		PH	PS	PK										
		≥1960				EH	ES	LK		PH	PS	PK										

Meloidae**Meloe***proscarabaeus* Linnaeus, 1758

EN	60	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH		PK									
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES				PK									

violaceus Marsham, 1802

LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	Sol	EnL
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	PeP	Ks	KiL	Sol	InL

brevicollis Panzer, 1793

RE	100*	<1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK		PS	PK									
		≥1960	A	U																		

Apalus*bimaculatus* (Linnaeus, 1761)

RE	100*	<1960		V	U		EK	ES														
		≥1960																				

Boridae**Borus***schneideri* (Panzer, 1796)
<table

Pythidae**Pytho***depressus* (Linnaeus, 1767)

LC	2	<1960		V	U	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	Pep	Ks	KiL	SoL	EnL	InL	
		≥1960		V	U	EK	St	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	Pep	Ks	KiL	SoL	EnL	InL

kolwensis Sahlberg, 1833

EN	40	<1960				St	EH		PH	PS											
		≥1960							PH		PK		Kn	OP	Pep	Ks					

abieticola J.Sahlberg, 1875

VU	30	<1960					EH		EP	PH											
		≥1960					St	EH		PH		PK		Kn	OP	Pep	Ks	KiL			InL

Pyrochroidae**Pyrochroa***coccinea* (Linnaeus, 1761)

LC	30	<1960		V	U	EK		EH	ES	LK											
		≥1960		V	U	EK		EH	ES	LK		PS	PK								

Schizotus*pectinicornis* (Linnaeus, 1758)

LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		KiL	SoL	EnL	InL	
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	Pep	Ks	KiL	SoL		InL

Salpingidae**Lissodema***cursor* (Gyllenhal, 1813)

RE	100	<1960	A																			
		≥1960	A																			

Rabocerus*foveolatus* (Ljungh, 1823)

LC	2	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn					InL
		≥1960	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	Pep	KiL	SoL	EnL	InL

gabrieli (Gerhardt, 1901)

LC	6	<1960		V	U		St	EH	ES		PH			KP	Kn	OP	Pep			EnL	InL
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP				

Sphaeriestes*castaneus* (Panzer, 1796)

LC	20	<1960	A	V	U	EK															
		≥1960	A	V	U	EK	St		ES												

bimaculatus (Gyllenhal, 1810)

LC	15	<1960		V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	Pep	SoL		InL
		≥1960	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	Pep		SoL		InL

stockmanni (Biström, 1977)

LC	15	<1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS		KP					
		≥1960	V	U	EK	St	EH	ES		PH	PS	PK	KP	Kn	OP		Ks	KiL	SoL	

reyi (Abeille de Perrin, 1874)

NE	100*	<1960		V	U																
		≥1960																			

planirostris (Fabricius, 1787)

LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP			KP		OP				
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP	Ks		EnL

ruficollis (Linnaeus, 1761)

LC	2	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	Pep	KiL		InL
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	Pep	Ks	KiL	SoL

Anthicidae**Notoxus***monoceros* (Linnaeus, 1761)

LC	6	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP			KP		OP				
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP		Ks	

Omonadus*floralis* (Linnaeus, 1758)

LC	4	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	Pep		
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH		PK	KP	Kn	OP	Pep	KiL	

formicarius (Goeze, 1777)

LC	20	<1960	A	V	U		St	EH	ES	LK	EP									
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH		PK	KP					

Stricticollis*tobias* (Marseul, 1879)

NA	100	<1960																		
		≥1960																		

Anthicus*flavipes* (Panzer, 1796)

LC	15	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK		Kn	OP			
		≥1960	A	V	U	EK	St	EH	ES	LK				PK		Kn	OP	Pep		

antherinus (Linnaeus, 1761)
NT	20	<1960	A	V	U	EK	St	EH	ES		EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP			

<tbl_r cells="21" ix="

ater (Thunberg, 1787)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Sol
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL
umbrinus LaFerté-Sénectère, 1849	CR	100	<1960	A V U St EH ES LK PS
			≥1960	U
bimaculatus (Illiger, 1801)	NT	60	<1960	U St EP PS KP OP
			≥1960	U St EH EP PS KP OP
sellatus (Panzer, 1796)	VU	80	<1960	U St ES Kn
			≥1960	U EK ES Kn

Aderidae

Phytobaenus

amabilis F.Sahlberg, 1834	NT	40	<1960	V U St EH
			≥1960	EK EH ES LK PS

Aderus

populneus (Creutzer, 1796)	LC	20	<1960	U
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH

Euglenes

pygmaeus (DeGeer, 1775)	LC	4	<1960	EH ES PH PK
			≥1960	A V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP

nitidifrons (Thomson, 1886)

	NA	100	<1960	
			≥1960	V

Anidorus

nigrinus (Germar, 1842)	LC	15	<1960	
			≥1960	A V U EK EH ES LK PH PS PK

Pseudanidorus

pentatomus (Thomson, 1864)	LC	10	<1960	A V EH PH PS
			≥1960	A V U EK St EH ES PS OP PeP KiL Sol

Scaptiidae

Scaptia

fuscula Müller, 1821	NT	40	<1960	V U
			≥1960	V U EH PS

Cyrtanaspis

phalerata (Germar, 1847)	CR	100	<1960	
			≥1960	U

Anaspis

bohemica Schilsky, 1899	LC	4	<1960	A V U ES Ks
			≥1960	V U EK St EH ES PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol InL

Iurida Stephens, 1832

	NA	100	<1960	A
			≥1960	EK

frontalis (Linnaeus, 1758)

	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL

marginicollis Lindberg, 1925

	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks

thoracica (Linnaeus, 1758)

	LC	6	<1960	A V U St EH ES PH PK Ks InL
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH KP Kn

arctica Zetterstedt, 1828

	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL

rufilabris (Gyllenhal, 1827)

	LC	2	<1960	A V U St EH ES PH PS PK OP PeP Ks KiL SoL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL

flava (Linnaeus, 1758)

	LC	60	<1960	A V U
			≥1960	A

brunnipes (Mulsant, 1856)

	NE	100*	<1960	U
			≥1960	

	NE	100*	<1960	U
			≥1960	

Cerambycidae

Prionus

coriarius (Linnaeus, 1758)	NT	80	<1960	V U ES
			≥1960	V U EK

<i>scalaris</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks KiL SoL EnL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
<i>perforata</i> (Pallas, 1773)	LC	20	<1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP PeP
			≥1960	V U EK EH ES PH PS PK Kn OP PeP
Stenostola				
<i>dubia</i> (Laicharting, 1784)	NT	30	<1960	V U EH
			≥1960	V U EH
Oberea				
<i>oculata</i> (Linnaeus, 1758)	LC	15	<1960	V U St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP PeP
Phytoecia				
<i>cylindrica</i> (Linnaeus, 1758)	LC	60	<1960	ES LK PK
			≥1960	EK ES LK PK
Tetrops				
<i>praeusta</i> (Linnaeus, 1758)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PS PK KP Kn
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn
Megalopodidae				
Zeugophora				
<i>scutellaris</i> Suffrian, 1840	LC	60	<1960	A V U EH ES LK PK
			≥1960	A V U EH ES
<i>subspinosa</i> (Fabricius, 1781)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK Kn Ks
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks SoL InL
<i>turneri</i> Power, 1863	LC	80	<1960	A V U EH ES EP
			≥1960	V U St EH ES
Orsodacnidae				
Orsodacne				
<i>cerasi</i> (Linnaeus, 1758)	NT	80	<1960	V
			≥1960	V EH
Chrysomelidae				
Macroplea				
<i>appendiculata</i> (Panzer, 1794)	LC	60	<1960	U ES PS KP KiL
			≥1960	V EH PH PK Ks EnL
<i>mutica</i> (Fabricius, 1792)	LC	20	<1960	A V U St EP KP OP
			≥1960	A V U EK St EP OP EnL
<i>pubipennis</i> (Reuter, 1875)	VU	60	<1960	A V U EP KP OP
			≥1960	A V U EK St EP OP
Donacia				
<i>clavipes</i> Fabricius, 1792	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP
<i>crassipes</i> Fabricius, 1775	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP Ks
			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK Kn OP Ks
<i>dentata</i> Hoppe, 1795	LC	15	<1960	V U EK St EH ES EP PS PK KP PeP
			≥1960	V U EK St EH ES LK PH PS PK Kn PeP
<i>versicolorea</i> (Brahm, 1790)	LC	15	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP OP PeP
			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PS PK PeP
<i>semicuprea</i> Panzer, 1796	RE	100*	<1960	ES
			≥1960	
<i>fennica</i> (Paykull, 1800)	LC	60	<1960	U St EH ES PH
			≥1960	U EK St EH
<i>sparganii</i> Ahrens, 1810	LC	20	<1960	V U EH ES PH PS PK KP Kn OP
			≥1960	V EK St EH ES LK PH PS PK
<i>aquatica</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL InL
			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL SoL EnL InL
<i>impressa</i> Paykull, 1799	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP
			≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS PK KP PeP

Gastrophysa*polygoni* (Linnaeus, 1758)

LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol																				
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PK KP OP PeP																				InL

viridula (DeGeer, 1775)

LC	6	<1960							PK	Kn	PeP	Ks											
		≥1960							PK KP Kn OP PeP	Ks KiL Sol	InL												

Phaedon*cochleariae* (Fabricius, 1792)

LC	4	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK								PeP											EnL	
		≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PK KP Kn OP PeP																				

armoraciae (Linnaeus, 1758)

LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP																				InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol																				

concinnus (Stephens, 1831)

LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP																				EnL
		≥1960	V EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol																				InL

Hydrothassa*glabra* (Herbst, 1783)

EN	80	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn																				
		≥1960	A U EK ES LK PH PS PK KP																				

marginella (Linnaeus, 1758)

LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP																				InL
		≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol																				

hannoveriana (Fabricius, 1775)

NT	40	<1960	V U St EH ES PH PS PK KP Kn OP																				KiL
		≥1960	V U St EH ES LK PK OP																				

Prasocuris*phellandrii* (Linnaeus, 1758)

LC	6	<1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK Kn OP																				KiL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS KP Kn OP																				

Plagioderma*versicolora* (Laicharting, 1781)

LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP																				EnL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol																				InL

Chrysomela*cuprea* Fabricius, 1775

NT	60	<1960	V U EH PH PK KP Ks																				InL
		≥1960	U EH																				

lapponica Linnaeus, 1758

LC	30	<1960	V U St EH ES LK EP PH PS PK OP Ks KiL Sol																				InL
		≥1960	V U EK St EH ES EP PH PS KP OP Ks KiL Sol EnL InL																				

collaris Linnaeus, 1758

LC	15	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol																				InL
		≥1960	A U EH ES EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks																				EnL

vigintipunctata (Scopoli, 1763)

LC	30	<1960	V U EK EH ES LK EP PH PK																				
		≥1960	U EK EH ES LK EP PH PK																				

populi Linnaeus, 1758

LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP																				InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL																				

tremula Fabricius, 1787

LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK OP																				EnL
		≥1960	A V U EK St EH ES PS PK KP Kn OP																				InL

saliceti (Weise, 1884)

NA	100	<1960	U																				
		≥1960	EK																				

Plagiosterna*aenea* (Linnaeus, 1758)

LC	6	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP																				
		≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn OP																				Ks

Gonioctena*flavicornis* (Suffrian, 1851)

VU	80	<1960	V St EH EP PS PK PeP																				
		≥1960	ES																				

viminalis (Linnaeus, 1758)
LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP																				

<i>aridula</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	15	<1960		U	EH	ES	EP	PH	PS	PK	KP								
<i>mannerheimii</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	4	<1960		A	V	U	EK	EH	ES	LK	PH	PK							
<i>subcoerulea</i> (Kutschera, 1864)	NA	100*	<1960		V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP		
<i>hortensis</i> (Geoffroy, 1785)	LC	4	<1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	
<i>sahlbergii</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	4	<1960		A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	
<i>Dibolia</i>			>1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	
<i>depressiuscula</i> Letzner, 1847	RE	100*	<1960							ES	LK			PK						
<i>Sphaeroderma</i>			>1960																	
<i>testaceum</i> (Fabricius, 1775)	LC	40	<1960																	
<i>Psylliodes</i>			>1960																	
<i>affinis</i> (Paykull, 1799)	LC	15	<1960		A	V	U		EH			EP								
<i>marcidus</i> (Illiger, 1807)	NT	60	<1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	PH							
<i>picinus</i> (Marsham, 1802)	LC	60	<1960																	
<i>attenuatus</i> (Koch, 1803)	NA	100*	<1960																	
<i>chrysocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	EN	100*	<1960		A	V	U													
<i>tricolor</i> Weise, 1888	VU	100	<1960		A	V	U													
<i>napi</i> (Fabricius, 1792)	LC	6	<1960		A	V	U		St	EH	ES		EP			PK				
<i>crambicola</i> Lohse, 1954	LC	40	<1960		A	V	U													
<i>hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758)	RE	100*	<1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	Kn	OP		
<i>chalcomerus</i> (Illiger, 1807)	NA	100	<1960																	
<i>dulcamarae</i> (Koch, 1803)	LC	40	<1960		A	V	U	EK		EH										
<i>cucullatus</i> (Illiger, 1807)	LC	15	<1960		A	V	U		St	EH	ES	LK		PH	PS	PK				
<i>Hypocassida</i>			>1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn		
<i>subferruginea</i> (Schrank, 1776)	NA	100*	<1960																	
<i>Cassida</i>			>1960																	
<i>viridis</i> Linnaeus, 1758	LC	6	<1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP			
<i>hemisphaerica</i> Herbst, 1799	NE	100*	<1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP			
<i>murraea</i> Linnaeus, 1767	VU	80	<1960																	
<i>nebulosa</i> Linnaeus, 1758	LC	20	<1960		A	V	U		St	EH	ES	LK	EP	PH	PS	PK	KP	Kn	OP	
<i>flaveola</i> Thunberg, 1794	LC	4	<1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PH	PS	PK	KP	Kn	OP	KiL
<i>vibex</i> Linnaeus, 1767	LC	15	<1960		A	V	U		EH	ES	LK				PK					SoL
			>1960		A	V	U	EK	St	EH	ES	LK		PS	PK					

<i>ater</i> (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A V U St EH ES	PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL
<i>sculpturatus</i> Waltl, 1839	LC	2	<1960	A V U St EH ES	EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
Phloeophagus			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK	Kn OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
<i>lignarius</i> (Marsham, 1802)	RE	100*	<1960	V	
<i>turbatus</i> Schönherr, 1845	LC	15	<1960	V U	PS
<i>Magdalisa</i>			≥1960	A V U EK EH ES LK PH PS PK	OP PeP
<i>phlegmatica</i> (Herbst, 1797)	LC	10	<1960	A V U EH ES	EP PH PS PK KP Kn
<i>nitida</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	40	<1960	V U St EH	PH PS
<i>linearis</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	60	<1960	V U	PH PK Kn
<i>duplicata</i> Germar, 1819	LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH	PK KP Kn OP PeP Ks Sol
<i>frontalis</i> (Gyllenhal, 1827)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH	PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL
<i>violacea</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A V U EK St EH ES	EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil
<i>carbonaria</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES	EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks Kil EnL InL
<i>barbicornis</i> (Latreille, 1804)	VU	100	<1960	A	
<i>ruficornis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	4	<1960	A V U	OP
<i>Lepyrus</i>			≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP	EnL
<i>quadrinotatus</i> Boheman, 1842	LC	40	<1960		OP PeP Kil Sol EnL InL
<i>arcticus</i> (Paykull, 1792)			≥1960		OP PeP Kil Sol EnL InL
Hylobius					
<i>excavatus</i> Laicharting, 1781	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn	OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
<i>piceus</i> (DeGeer, 1775)			≥1960	A V U EK St EH ES EP PH PS PK KP Kn	OP PeP Ks Kil Sol InL
<i>abietis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	1	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn	OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
<i>pinastri</i> (Gyllenhal, 1813)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn	OP PeP Ks Kil Sol
<i>transversovittatus</i> (Goeze, 1777)	LC	40	<1960	A V U EH	
<i>Pissodes</i>			≥1960	V U EK St EH ES EP	
<i>castaneus</i> (DeGeer, 1775)	LC	6	<1960	A V U EK St EH ES	EP PH PS PK KP Kn
<i>pini</i> (Linnaeus, 1758)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn	OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
<i>gyllenhalii</i> (Sahlberg, 1834)	LC	2	<1960	A V U EK St EH ES	EP PH PS PK KP Kn
<i>validirostris</i> (Sahlberg, 1834)	LC	10	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn	OP PeP Ks Kil
<i>harcyniae</i> (Herbst, 1795)	LC	4	<1960	A V U St EH	EP PH PK KP Kn
<i>piniphilus</i> (Herbst, 1797)	LC	4	<1960	A V U St EH ES	EP PH PS PK KP Kn
<i>Trachodes</i>			≥1960	V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn	OP PeP Ks Kil Sol EnL InL
<i>hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	10	<1960	A V U St EH ES	
			≥1960	A V U FK St FH ES LK PH PS PK	

Cryptorhynchus*lapathi* (Linnaeus, 1758)

LC	4	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL EnL

Acalles*echinatus* (Germar, 1824)

LC	30	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL
		≥1960	A V U EK

Baris*artemisiae* (Panzer, 1794)

LC	60	<1960	V St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL
		≥1960	V EK EH ES

Limnobaris*t-album* (Linnaeus, 1758)

LC	10	<1960	V EH EP PS KP OP PeP Ks InL
		≥1960	A V U St EH ES EP PH PK KP Kn OP PeP Ks

dolorosa (Goeze, 1777)*pilistriata* (Stephens, 1831)

LC	2	<1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL

Eubrychius*velutus* (Beck, 1817)

LC	60	<1960	A V U St EP PS Ks InL
		≥1960	U EK St OP

Phytobius*leucogaster* (Marsham, 1802)

LC	40	<1960	A V St EH ES PS OP
		≥1960	V U EK St EH ES PH PK KP OP

Pelenomus*commari* (Panzer, 1795)*comari* (Herbst, 1795)

LC	10	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS KP OP PeP KiL EnL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PK KP PeP

waltoni (Boheman, 1843)

LC	60	<1960	V U EH
		≥1960	V U EK EH LK PK

canaliculatus (Fähraeus, 1843)

LC	30	<1960	A V U EH LK EP KP KiL
		≥1960	A V U St EH LK PH PK KP OP PeP

quadrituberculatus (Fabr., 1787)

LC	6	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK Kn Ks
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP Ks

velaris (Gyllenhal, 1827)

LC	20	<1960	V U EH ES EP PS PK SoL InL
		≥1960	V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn PeP KiL SoL EnL InL

quadricorniger (Colonnelly, 1986)

NA	100	<1960	
		≥1960	LK

Neophytobius*muricatus* (Bris. de Barn., 1867)

LC	80	<1960	
		≥1960	A U EK EH LK PS

quadrinodosus (Gyllenhal, 1813)

VU	100	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn
		≥1960	A

Rhinoncus*albicinctus* Gyllenhal, 1837

NA	100	<1960	
		≥1960	U ES

perpendicularis (Reich, 1797)

LC	6	<1960	A U EH ES PS OP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK PH PS PK

inconspectus (Herbst, 1795)

LC	30	<1960	V U EH ES LK
		≥1960	A V U EK St EH LK

pericarpinus (Linnaeus, 1758)

LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP OP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP

bruchoides (Herbst, 1784)

LC	6	<1960	A V U St EH ES LK EP PS PK KP OP
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP OP

castor (Fabricius, 1792)

LC	1	<1960	A V U St EH ES LK PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL InL
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks KiL Sol EnL InL

Auleutes*epilobii* (Paykull, 1800)

LC	2	<1960	A V U St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks
		≥1960	A V U EK St EH ES LK EP PH PS PK KP Kn OP PeP Ks

